

## மக்காச்சோளம்

பயிர்மேம்பாடு

### I. பருவம் மற்றும் இரகங்கள்

மாவட்டங்கள் / பருவம்	இரகம் / வீரிய ஒட்டு இரகங்கள்
முனாகாரி	
1. ஆழப்பட்டம் (ஜூலை-ஆகஸ்ட்)	கோ 1, கோள்ள(எம்) 4, கோபிசி 1
2. புரட்டாசிப்பட்டம் (செப்டம்பர்- அக்டோபர்)	கோ 1, கோள்ள(எம்) 4, கோபிசி 1
3. தைப்பட்டம் (ஐஞ்சலி-பிப்ரவரி)	கோ 1, கோள்ஸ(எம்) 4, கோபிசி 1

### மக்காச்சோள இரகங்களின் விபரங்கள்

விபரம்	கோ 1	கோள்ஸ(எம்) 4	கோபிசி 1
பெற்றோர்	இந்தோனேசிய இரகம் குவான் 1ல் இருந்து தேர்வு	(யுள்ள 90 x யுள்ள 285) x யுள்ள 112	யுள்ள 836 மற்றும் யுள்ள 836 1-2ல் இருந்து தேர்வு
வயது (நாட்கள்)	105-110	90-95 நாட்கள்	55-65
மாவட்டங்கள்	கோயறுத்தூர், ஈரோடு, நிருப்பிலேவி, தஞ்சாவூர், புதுக்கொட்டை	கோயறுத்தூர், திண்ணுக்கூல், ஈரோடு, கோவம், விருதுநகர், பொம்பூர், தூத்துக்குடி, மதுங்ர மற்றும் தேனி	மக்காச்சோளம் சாகுபடி வெச்யப்பும் அலைத்து மாவட்டங்கள்
இருங்கு மானாவாரி	இரண்டும்	இரண்டும்	இரண்டும்
தானிய மக்குல் (கிலோ/ எக்டர்)			
இருங்கு	5200	5694	6700 (கிலோ/ எக்டர்) பிழகுக்கத்தில் மற்றும் 32300 (கிலோ/ எக்டர்) பச்சைத்தட்டை
மானாவாரி	3300	4521	3000 (கிலோ/ எக்டர்) பிழகுக்கத்தில்
சிறப்புக் குணங்கள்	அடிச்சாம்பல் நோய் வதிர்ப்புத்திறன் உடையது, ஆரஞ்ச நிற கீவிளின் வகை மணிகள்	குறைந்த வயது யானாவாரி பருவத்திற்கு உத்திரவு, அடிச்சாம்பல் மற்றும்தன்மீ துளைப்பான் தாக்குதலுக்கு மிதமான எதிர்ப்பத்திறன்	செஷ்கு 2-3 கதிர்கள் இனிய கங்கி மற்றும் கங்கல உடையது, உள் மற்றும் வெளிநோட்டு ஏற்றுமதிக்கு உத்திரவு, பச்சைத்தட்டை தீவனாக்கிற்கு ஏற்றது.
இனையுறை நிறம்	பச்சை	பச்சை	பச்சை
கணுயியல்	பச்சை	பச்சை	பச்சை
நடுநரம்பு	வெங்களை	வெங்களை	வெங்களை
கதிர் ஆனவு	பெரியது	பெரியது	சிறியது
கதிரின் மேல் தோல்	முழுதாக மூடியிருக்கும்	முழுதாக மூடியிருக்கும்	--
தானிய நிறம்	ஆரஞ்ச	மஞ்சள்	மஞ்சள்
துளியத்தில் தன்மை	கீபிளினின்	கீபிளினின்	ஒடன்