

பாசிப்பயறு

I. பருவம் மற்றும் இரகங்கள்

மாவட்டம் / பருவம்	இரகங்கள்
ஆடுப்பட்டம் (ஜூன் - ஜூலை)	
காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாற், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை, மதுரை, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், திருச்சி, பெரம்பலூர் மற்றும் கழூர்	கேள்ம் 2, கோ 4, கோ 6, வம்பன் (ஜிளி) 2 மற்றும் 2 விரிஞ்சிபுரம் 1
சேலம், நாமக்கல் தர்மபுரி	கோ 4, கோ 6, கேள்ம் 2, வம்பன் 1 மற்றும் வம்பன் (ஜிளி) 2
கோ 4, கோ 6, கேள்ம் 2 மற்றும் பையூர் 1	கோ 4, கோ 6, கேள்ம் 2 பையூர் 1, வம்பன் 1 மற்றும் வம்பன்(ஜிளி) 2
கோ 4, கோ 6 மற்றும் வம்பன் 1	
இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி	கோ 4, கோ 6, கேள்ம் 2, வம்பன் 1 மற்றும் வம்பன் (ஜிளி) 2
புரட்டாசில் பட்டம் (செப்டம்பர் - அக்டோபர்)	
காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாற், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை	கோ 4, கோ 6, கேள்ம் 2, வம்பன் 1 மற்றும் வம்பன் (ஜிளி) 2
தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி	கோ 4, கோ 6, பையூர் 1 வம்பன் 1, வம்பன்(ஜிளி) 2 மற்றும் கோ 1
கோ 4, கோ 6, வம்பன் 1 மற்றும் வம்பன்(ஜிளி) 2	
இராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி திருச்சி, பெரம்பலூர், கழூர்	கோ 4, கோ 6, கேள்ம் 2 பையூர் 1 மற்றும் கே 1
கோ 4, கோ 6, பையூர் 1	பையூர் 1, கோ 1, வம்பன் 1 மற்றும் வம்பன் (ஜிளி) 2
நெல் தரிசு (ஜூன் வரி - பிப்ரவரி)	
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், திருச்சி, பெரம்பலூர், கழூர், புதுக்கோட்டை, திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி	ஏசடி 3
கோடை (பிப்ரவரி - மார்ச்)	
காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாற், வேலூர், திருவண்ணாமலை, கடலூர், விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை	கோ 4, கோ 6, கேள்ம் 2
சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், கழூர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி	கோ 4, கோ 6 மற்றும் பையூர் 1
கோ 4, கோ 6 மற்றும் பையூர் 1	கோ 4, கோ 6 மற்றும் பையூர் 1
மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, இராமநாதபுரம், விருதுநகர், சிவகங்கை	கோ 4, கோ 6, கேள்ம் 2 மற்றும் பையூர் 1

பாசிப்பயறு இரகங்களின் இயல்புகள்

	கேள்ம் 2	கோ 4	ஏசடி 3	பையூர் 1	வம்பன் 1
பெற்றோர்	எண் 127 x 9ன் கலப்பு (முறையில் உருவாக்கப் பட்டது	கோ 1 ன் சடுதி மாற்றும்	எச் 7016 x இராஜேந்திரன் ஜி 65 கலப்பு (முறையில் உருவாக்கப் பட்டது	ஸ்பிட 703ன் தனி வழித் தேர்வு	எல் 8 x பிள்ளை எஸ் 3ன் கலப்பு முறையில் உருவாக்கப் பட்டது
வெளியிட்ட ஆண்டு	1978	1981	1988	1988	1989
50 ரத்துக்கும் நாட்கள்	35 40	40 45	36	45 50	30 35
வயது (நாட்கள்)	65 - 70	85	66	85 - 90	65
மக்குல் (கிளோ / எக்டர்)					
மாணாவாரி	767	910	500	742	770
இறைவை	-	1550	500 (நெல் தரிசு)	742	770
செடி உயரம்	35 - 45	60 - 70	35 - 45	55 - 60	55 - 60
கிளையின் நிறம்	பச்சை தண்டு	பச்சை தண்டு	பச்சை தண்டு	பச்சை தண்டு	பச்சை மற்றும் உரோய் அற்றது

கிளைகளின் எண்ணிக்கை	-	3 - 4	2 - 3	3 - 4 5 - 6 கொத்து	2 - 3
இலை	நடுத்தரம்	ஆகஸ்டான் ரோம் கொண்டது	நடுத்தர ஆகஸ்ட் இலைதன்டு நீளமானது	ஆகஸ்டானது	நடுத்தர நீள வட்ட வடிவம்
காய்	அடர் பழப்பு நூணி வளைந்தது	கருப்பு	அடர் பழப்பு	வெளிறிய பச்சை	குறைந்த உரோம் வெளிறிய கருப்பு
செழியின் நிறம்	பனபளப்பு பச்சை	வெளிறிய பச்சை	பச்சை	வெளிறிய பச்சை	பச்சை
100 விதை எடை (கிராம்)	3.0	4.1	2.3	3.5	3.6

பாசிப்பயறு இரகங்களின் தொடர்ச்சி

	கே 1	கோ 6	விரிஞ்சிபூரம் 1	வம்பன் (ஜி ஜி) 2
பெற்றோர்	கோ 4 x எல் 65	பென்யூ ஜினி 37 x கோ 5	கே 851 ல் இருந்து தனிவழித் தேர்வு	வினினி 4 x எம்னச் 309 கலப்பினம்
வெளியிட்ட ஆண்டு	1998	1999	2001	2001
50 சதம் பூக்கும் நூட்கள்	70 - 75	26 - 30	31 - 35	30 - 35
வயது (நூட்கள்)	-	62 - 67	56 - 67	65 - 70
மக்குல் (கிலோ / எக்டா)				
யானாவாரி	670	900	1100	750
இறங்குவை	670	1050	-	900
செழியின் உயரம்	70 - 75	35 - 55	45 - 55	50 - 60
கிளையின் நிறம்	பச்சை மற்றும் உரோமம் அற்றது	-	-	-
கிளைகளின் எண்ணிக்கை	3 - 4	-	-	-
இலை	அகஸ்டானது	அகஸ்டானது	அகஸ்டானது	ஷந்ரோலியேப் மற்றும் லோப்ஸ்
காய்	நீண்ட குறைந்த அளவு உரோமம் பழப்பு நிறம்	உரோமம் அற்றது	உரோமம் அற்றது	சிறிதளவு உரோமம்
செழியின் நிறம்	வெளிறிய பச்சை	பச்சை	பனபளப்பு பச்சை	பனபளப்பு பச்சை
100 விதை எடை (கிராம்)	3.5	3.4	3.5	3.6 - 3.9