தேனி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை

(09-12-2015 – 13-12-2015)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

தேதி: 08-12-2015

கடந்த கால வானிலை 04-12-2015 முதல் 07-12-2015 வரை

காரணிகள்	**கடந்த கால வானிலை**
மழை (மி.மீ)	21.93
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	29-30
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	23-24
மேக மூட்டம்	6-8
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	71-95
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	7-13

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 13-12-2015 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	**09.12.15**	**10.12.15**	**11.12.15**	**12.12.15**	**13.12.15**
மழை (மி.மீ)	9	9	7	2	1
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25	25	25	26	26
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	19	19	19	20	20
மேக மூட்டம்	7	7	7	6	6
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	93	93	93	85	85
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம்(சதவீதம்)	88	88	88	80	80
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	7	7	7	7	7
காற்றின் திசை	வடகிழக்கு	வடகிழக்கு	வடகிழக்கு	கிழக்கு வடகிழக்கு	கிழக்கு வடகிழக்கு

குறுஞ்செய்தி

எதிர்வரும் ஐந்து நாட்களில் இலேசான தூறல் சில இடங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள

முக்கிய பயிர்கள்: நெல், பருத்தி, கரும்பு மற்றும் காய்கறிகள்

பருவம்: நெல்- வளர்ச்சி பருவம், பருத்தி- பூக்கும் பருவம்

- சொட்டுநிர் பாசனம் மேற்கொள்வதன் மூலம் நீர்த்தேவைகளைக் குறைக்கலாம்.
- அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் விவசாயிகள் தங்களுடைய நெற்பயிர்களுக்கு பூச்சி மருந்தை அடிப்பதை தவிர்க்குமாறும் மற்றும் உரமாடுதல் தள்ளிபோடுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
- கரும்பு இரும்புச்சத்து பற்றாக்குறை நிவர்த்தி செய்ய 250 கிராம் பெர்ரஸ் சல்பேட் 100 லிட்டர் தண்ணிரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது எக்கருக்கு 25 கிராம் பெர்ரஸ் சல்பேட் மண்வழி இடலாம்.
- மக்காச்சோளத்தில் அடி சாம்பல் நோயினைக் கட்டுப்படுத்த Metalaxyl+Mancozeb @ 100g/ha ஆகியவற்றை விதைத்த 20 நாளில் தெளிக்கவும்.
- மழை நீர் சூழ்ந்துள்ள வயல்களில் உடனடியாக வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி நீரினை வடித்து வேர்பகுதிக்கு காற்றொட்டம் கிடைக்கச் செய்யவும்.
- பருத்தியில் இலை பழுப்பு நோயைக் கட்டுப்படுத்த sulphate+Tetracycline mixture 100g+Copper oxychloride 1250g/ha தண்ணிரில் கலந்து தெளிக்கவும். மேலும் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை 10 நாள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.