

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர்மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(06.06.2015 முதல் 10.06.2015)

அறிக்கை எண் 43/2015

தேதி: 05.06.2015

மாநிலத்தின் கடந்த வார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல் நேர வெப்பநிலை 30°செ முதல் 38°செ ஆகவும், இரவு நேர வெப்பநிலை 21°செ முதல் 29°செ ஆகவும் பதிவானது. கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல் நேர வெப்பநிலை 20°செ முதல் 23°செ ஆகவும், இரவு நேர வெப்பநிலை 11°செ முதல் 13°செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழ் நாட்டில் ஒரு சில இடங்களில் இலேசானது முதல் மிதமான மழை காணப்பட்டது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை கோயமுத்தூர் (06.06.2015 முதல் 10.06.2015)

வரும் நாட்களில் வானம் இலேசான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இலேசான தூறல் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32°செ முதல் 33°செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23°செ முதல் 24°செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 78 முதல் 85 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 75 முதல் 78 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 7 கி.மீ அளவுக்கு பெரும்பாலும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

தேதி	மழை (மி.மீ)	அதிகபட்ச வெப்ப நிலை (°செ)	குறைந்த பட்ச வெப்ப நிலை (°செ)	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/ மணி)	காற்று வரும் திசை
06.06.15	4	33	24	4	78	75	7	தென்மேற்கு
07.06.15	2	33	24	3	78	75	7	தென்மேற்கு
08.06.15	3	33	24	3	78	78	7	தென்மேற்கு
09.06.15	15	32	23	7	85	78	7	தென்மேற்கு
10.06.15	8	32	23	7	85	78	7	தென்மேற்கு

வேளாண் அறிவுரை

- ✓ புதியதாக அறுவடை செய்யப்பட்ட நிலங்களை உழுவதினால் மழையினால் ஏற்படும் மண் அரிப்பினை தடுக்கலாம்.
- ✓ கார் கால குறுகிய வயது நெல் நடவு செய்வதற்கு முன் அடி உரத்துடன் ஏக்கருக்கு 200 கிலோ வேப்பம்புண்ணாக்கு இடுவதினால் மண்ணில் தங்கியுள்ள நோய் கிருமிகளையும், பூச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- ✓ தொடர்ச்சியான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அனைத்து இறவைப் பயிர்களுக்கும் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும்.
- ✓ புதியதாக முளைத்துள்ள புற்களில் கால்நடைகளை மேயவிடாமல் தடுத்து பாக்கிரியா வகை நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கவும்.
- ✓ மழையில்லாத பகுதிகளில், கூடுதலான வெப்பம் காரணமாக பயறு மற்றும் காய்கறிகளில் சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சிகளால் ஏற்படும் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு 40 மிலி இமிடாகுளோரிபிரிட் மருந்தினை தெளிக்கவும்.

குறுஞ்செய்தி

- ✓ கார் கால குறுகிய வயது நெல் நடவு செய்வதற்கு முன் அடி உரத்துடன் ஏக்கருக்கு 200 கிலோ வேப்பம்புண்ணாக்கு இடுவதினால் மண்ணில் தங்கியுள்ள நோய் கிருமிகளையும், பூச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தலாம்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சி மையம்
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை.