



நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(06.06.2015 முதல் 10.06.2015 வரை)

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இ ஆடுதுறை - 612 101

போன் 0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in - Fax: 0435 2472881



தேதி 05.06.15

கடந்த 3 நாளில் நிலவிய வானிலை (02605.15 - 04.06.15)

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	8.7
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	33-36
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	27-28
மேக ஸ்டீட்டம்	4-7
ஈரப்பதம் (%)	76-89
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.)	3-9

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர் பார்த்துக் கொள்ளும் வானிலை				
	தேதி-1 06,06,15	தேதி-2 07,06,15	தேதி-3 08,06,15	தேதி-4 09,06,15	தேதி-5 10,06,15
மழை (மி.மீ)	0	0	2	6	2
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	35	35	35	34	33
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	28	28	28	27	26
மேக ஸ்டீட்டம்	2	2	3	6	7
ஈரப்பதம் (%)	70-77	70-77	70-77	74-85	75-88
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.மணிக்கு)	6	6	6	6	6
காற்றின் திசை	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு

- 06.06.15 முதல் 08.06.15 வரை வானம் சற்று மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 09.06.15 மற்றும் 10.06.15 அன்று வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருள்கூழ்ந்து காணப்படும். எதிர் பார்த்துக் கொள்ளும் மழை அளவு 2- 6 மி.மீ.

வேளாண் அறிவுரைகள்

முக்கிய பயிர்கள் நெல்லு கரும்பு வாழை மற்றும் பருத்தி

நெல்தரிக பருத்தி காய்ப்பிடிக்கும் பருவம்? என் முதிர்ச்சி மற்றும் அறுவடை பருவம்

நெல் நாற்றங்கால் தயார் செய்தல்

- குறுவை பருவத்திற்கு ஏற்ற நெல் இரகங்களான ஆடுதுறை 36? ஆடுதுறை 43? ஆடுதுறை 45 மற்றும் கோ 51 விதைகளை விதைப்பு செய்வதற்கு முன்பு விதை நேர்த்தி செய்வது அவசியம். நெல் விதைகளை கார்பென்டாசிம் மருந்து 1 கிலோ விதைக்கு 2 கிராம் அல்லது சூடோமோனாஸ் பாக்டீரியா 10 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து ஈர விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்க வேண்டும். இதனால் விதைகள் ஸ்டீலம் பரவக் கூடிய நோய்களை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- குறுவை பருவத்திற்கு நாற்றங்கால் தயார் செய்யும் போது ஒரு எக்டருக்கான 20 சென்ட் நாற்றங்காலில் ஒரு டன் தொழு உரம் அல்லது கம்போஸ்ட் இடவேண்டும். கடைசி உழவின் போது நாற்றங்காலுக்கு 40 கிலோ டி.ஏ.பி உரம் அடியுமாக இடவேண்டும். களிமணர் நிலத்திற்கு 4 கிலோ ஷிப்சமும்? ஒரு கிலோ டி.ஏ.பி. ஒரு சென்ட் நாற்றங்காலுக்கு என்ற அளவில் விதைத்த 10 ஆம் நாள் இடவேண்டும். இது வேர் அறுபடாமல் நாற்றுக்களை பறிக்க உதவும்.
- சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள கோடை நெற்பயிரில் குலை நோய்த் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் 200 கிராம் , ஏக்கர் அல்லது கார்பென்டெசிம் 200 கிராம் , ஏக்கர் என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- தற்பொழுது நிலவும் வானிலையின் காரணமாக கோடை நெற்பயிரில் இலையுறை கருகல் நோய் பரவலாக தென்படுகிறது இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு கார்பன்டெசிம் 200 கிராம் அல்லது புரோப்பிகோனோசோல் 200 மி.லி. மருந்தை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

இயக்குநர்