



**நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(10.06.2015 முதல் 14.06.2015 வரை)**

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இ ஆடுதுறை - 612 101

போன் : 0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in - Fax: 0435 2472881



தேதி 09.06.15

கடந்த 4 நாளில் நிலவிய வானிலை (05605.15 - 08.06.15)

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	34-36
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	25-28
மேக மூட்டம்	3-7
ஈரப்பதம் (%)	68-77
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.)	8-18

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர் பார் க்கப்படும் வானிலை				
	தேதி-1 10,06,15	தேதி-2 11,06,15	தேதி-3 12,06,15	தேதி-4 13,06,15	தேதி-5 14,06,15
மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	32	32	32	31	32
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	29	29	29	29	29
மேக மூட்டம்	8	8	7	7	8
ஈரப்பதம் (%)	56-71	57-73	59-71	57-71	56-72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.மணிக்கு)	21	19	18	26	24
காற்றின் திசை	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு

➤ 10.06.15 முதல் 14.06.15 வரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருள்கூழ்ந்து காணப்படும். மழை இல்லை.

வேளாண் அறிவுரைகள்

முக்கிய பயிர்கள் நெல்லு கரும்பு வாழை மற்றும் பருத்தி

நெல்தரிக பருத்தி முதிர்ச்சி மற்றும் அறுவடை பருவம்? எள் முதிர்ச்சி மற்றும் அறுவடை பருவம் நெல் நாற்ற்கால் தயார் செய்தல்

- குறுவை பருவத்திற்கு ஏற்ற நெல் இரங்களான ஆடுதுறை 36? ஆடுதுறை 43? ஆடுதுறை 45 மற்றும் கோ 51 விதைகளை விதைப்பு செய்வதற்கு முன்பு விதை நேர்த்தி செய்வது அவசியம். நெல் விதைகளை கார்பென்டாசிடம் மருந்து 1 கிலோ விதைக்கு 2 கிராம் அல்லது சூடோமோனாஸ் பாக்கீரியா 10 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து ஈர விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்க வேண்டும். இதனால் விதைகள் மூலம் பரவக் கூடிய நோய்களை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- குறுவை பருவத்திற்கு நாற்ற்கால் தயார் செய்யும் போது ஒரு எக்டருக்கான 20 சென்ட் நாற்ற்காலில் ஒரு டன் தொழு உரம் அல்லது கம்போஸ்ட் இடவேண்டும். கடைசி உழவின் போது நாற்ற்காலுக்கு 40 கிலோ டி.ஏ.பி உரம் அடியுரமாக இடவேண்டும். களிமண் நிலத்திற்கு 4 கிலோ ஷிப்சமும்? ஒரு கிலோ டி.ஏ.பி. ஒரு சென்ட் நாற்ற்காலுக்கு என்ற அளவில் விதைத்த 10 ஆம் நாள் இடவேண்டும். இது வேர் அறுபடாமல் நாற்றுக்களை பறிக்க உதவும்.
- சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள கோடை நெற்பயிரில் குலை நோய்த் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் 200 கிராம் , ஏக்கர் அல்லது கார்பென்டெசிடம் 200 கிராம் , ஏக்கர் என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- தற்பொழுது நிலவும் வானிலையின் காரணமாக கோடை நெற்பயிரில் இலையுறை கருகல் நோய் பரவலாக தென்படுகிறது இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு கார்பன்டெசிடம் 200 கிராம் அல்லது புரோப்பிகோனோசோல் 200 மி.லி. மருந்தை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- பருத்தியில் மாவுச்சி தாக்குதல் தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த புரோபினோபாஸ் 400 மி.லி. ரூ அசாடிராக்டின் 10000 பி.பி.எம். 200 மி.லி. , ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

இயக்குநர்