



**திருவாரூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை**  
(06.06.2015 முதல் 10.06.2015 வரை)  
தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இ ஆடுதுறை - 612101 போன்  
0435 2472098 E-mail: [dirtrri@tnau.ac.in](mailto:dirtrri@tnau.ac.in) - Fax: 04352472881



**தேதி 05.06.15**  
**கடந்த 3 நாளில் நிலவிய வானிலை (02.06.15 - 04.06.15)**

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	1.1
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	35-37
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	27-28
மேக ஸ்டீட்டம்	3
ஈரப்பதம் (%)	70-76
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.)	4-5

**அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு**

காரணிகள்	எதிர் பார் க்கப்படும் வானிலை				
	தேதி-1 06,06,15	தேதி-2 07,06,15	தேதி-3 08,06,15	தேதி-4 09,06,15	தேதி-5 10,06,15
மழை (மி.மீ)	0	0	0	3	1
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	36	36	36	35	34
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	28	28	28	27	26
மேக ஸ்டீட்டம்	2	2	2	5	5
ஈரப்பதம் (%)	62-72	62-72	62-72	68-78	75-85
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.,மணிக்கு)	5	5	5	5	5
காற்றின் திசை	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு

- 06.06.15 முதல் 08.06.15 வரை வானம் சற்று மேகஸ்டீட்டத்துடன் காணப்படும். 09.06.15 மற்றும் 10.06.15 அன்று வானம் மேகஸ்டீட்டத்துடன் இருள்குழந்து காணப்படும். எதிர் பார் க்கப்படும் மழை அளவு 1-3 மி.மீ.

**வேளாண் அறிவுரைகள்**

**முக்கிய பயிர்கள் நெல் இ கரும்பு வாழை மற்றும் பருத்தி**

**நெல்தரிசு பருத்தி காய்பிடிக்கும் பருவம் ? என் முதிர்ச்சி மற்றும் அறுவடை பருவம்**  
**நெல் நாற்று கால் தயார் செய்தல்**

- குறுவை பருவத்திற்கு ஏற்ற நெல் இரகங்களான ஆடுதுறை 36 ? ஆடுதுறை 43 ? ஆடுதுறை 45 மற்றும் கோ 51 விதைகளை விதைப்பு செய்வதற்கு முன்பு விதை நேர்த்தி செய்வது அவசியம். நெல் விதைகளை கார்பென்டாசிம் மருந்து 1 கிலோ விதைக்கு 2 கிராம் அல்லது சூடோமோனாஸ் பாக்ளீரியா 10 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து ஈர விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்க வேண்டும். இதனால் விதைகள் ஸ்டீலம் பரவக் கூடிய நோய்களை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- குறுவை பருவத்திற்கு நாற்று கால் தயார் செய்யும் போது ஒரு எக்டருக்கான 20 சென்ட் நாற்று காலில் ஒரு டன் தொழு உரம் அல்லது கம்போஸ்ட் இடவேண்டும். கடைசி உழவின் போது நாற்று காலுக்கு 40 கிலோ டி.ஏ.பி உரம் அடியுரமாக இடவேண்டும். களிமண் நிலத்திற்கு 4 கிலோ ஷிப்சமும் ? ஒரு கிலோ டி.ஏ.பி. ஒரு சென்ட் நாற்று காலுக்கு என்ற அளவில் விதைத்த 10 ஆம் நாள் இடவேண்டும். இது வேர் அறுபடாமல் நாற்றுக்களை பறிக்க உதவும்.
- சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள கோடை நெற்பயிரில் குலை நோய்த் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் 200 கிராம் , ஏக்கர் அல்லது கார்பென்டெசிம் 200 கிராம் , ஏக்கர் என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- தற்பொழுது நிலவும் வானிலையின் காரணமாக கோடை நெற்பயிரில் இலையுறை கருகல் நோய் பரவலாக தென்படுகிறது இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு கார்பன்டெசிம் 200 கிராம் அல்லது புரோப்பிகோனோசோல் 200 மி.லி. மருந்தை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

**இயக்குநர்**