



திருவாரூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(10.06.2015 முதல் 14.06.2015 வரை)
தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இ ஆடுதுறை - 612101 போன்
0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in - Fax: 04352472881



தேதி 09.06.15

கடந்த 4 நாளில் நிலவிய வானிலை (05.06.15 - 08.06.15)

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	35-37
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	26-28
மேக ஸ்டீட்டம்	3
ஈரப்பதம் (%)	68-80
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.)	4-5

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர் பார் க்கப்படும் வானிலை				
	தேதி-1 10,06,15	தேதி-2 11,06,15	தேதி-3 12,06,15	தேதி-4 13,06,15	தேதி-5 14,06,15
மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	33	32	32	32	32
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	29	29	29	29	29
மேக ஸ்டீட்டம்	8	8	7	7	8
ஈரப்பதம் (%)	56-71	57-72	59-71	56-71	55-72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.மணிக்கு)	21	20	17	26	24
காற்றின் திசை	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு

➤ 10.06.15 முதல் 14.06.15 வரை வானம் மேகஸ்டீட்டத்துடன் இருள் சூழ்ந்து காணப்படும். மழை இல்லை.
வேளாண் அறிவுரைகள்
முக்கிய பயிர்கள் நெல் இரும்பு வாழை மற்றும் பருத்தி
நெல்தரிக பருத்தி முதிர்ச்சி மற்றும் அறுவடை பருவம் ? என் முதிர்ச்சி மற்றும் அறுவடை
பருவம் நெல் நாற்ற்கால் தயார் செய்தல்

- குறுவை பருவத்திற்கு ஏற்ற நெல் இரகங்களான ஆடுதுறை 36 ? ஆடுதுறை 43 ? ஆடுதுறை 45 மற்றும் கோ 51 விதைகளை விதைப்பு செய்வதற்கு முன்பு விதை நேர்த்தி செய்வது அவசியம். நெல் விதைகளை கார்பென்டாசிம் மருந்து 1 கிலோ விதைக்கு 2 கிராம் அல்லது சூடோமோனாஸ் பாக்ளீயா 10 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து ஈர விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்க வேண்டும். இதனால் விதைகள் ஸ்டீலம் பரவக் கூடிய நோய்களை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- குறுவை பருவத்திற்கு நாற்ற்கால் தயார் செய்யும் போது ஒரு எக்டருக்கான 20 சென்ட் நாற்ற்காலில் ஒரு டன் தொழு உரம் அல்லது கம்போஸ்ட் இடவேண்டும். கடைசி உழவின் போது நாற்ற்காலுக்கு 40 கிலோ டி.ஏ.பி உரம் அடியரமாக இடவேண்டும். களிமண் நிலத்திற்கு 4 கிலோ ஷிப்சமும் ? ஒரு கிலோ டி.ஏ.பி. ஒரு சென்ட் நாற்ற்காலுக்கு என்ற அளவில் விதைத்த 10 ஆம் நாள் இடவேண்டும். இது வேர் அறுபடாமல் நாற்றுக்களை பறிக்க உதவும்.
- சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள கோடை நெற்பயிரில் குலை நோய்த் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் 200 கிராம் , ஏக்கர் அல்லது கார்பென்டெசிம் 200 கிராம் , ஏக்கர் என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- தற்பொழுது நிலவும் வானிலையின் காரணமாக கோடை நெற்பயிரில் இலையுறை கருகல் நோய் பரவலாக தென்படுகிறது இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு கார்பன்டெசிம் 200 கிராம் அல்லது புரோபிகோனோசோல் 200 மி.லி. மருந்தை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- பருத்தியில் மாவூச்சி தாக்குதல் தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த புரோபினோபாஸ் 400 மி.லி. ஈ அசாடிராக்டீன் 10000 பி.பி.எம். 200 மி.லி. , ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

இயக்குநர்