

விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை
(ஜூன் 13-ம் தேதி முதல் ஜூன் 17-ம் தேதி வரை)
(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி
நிலையம்,
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய வானிலை
துறை)

முந்தைய வார வானிலை (9.6.15- 11.6.15)

மழை (மி.மீ.)	1.9
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	36- 37
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	24- 26
வானம் (ஆக்டா)	5- 7
ஈரப்பதம் (08:30 மணி) (சதவீதம்)	66- 71
ஈரப்பதம் (17:30 மணி) (சதவீதம்)	48- 55
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	0- 5
காற்றின் திசை	0

17.6.15 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன்னறிவிப்பு				
	நாள் 1 13.6.15	நாள் 2 14.6.15	நாள் 3 15.6.15	நாள் 4 16.6.15	நாள் 5 17.6.15
மழை (மி.மீ.)	12	4	0	0	1
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	36	36	36	37	37
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	25	25	25	25	25
வானம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	52- 74	52- 74	52- 74	52- 70	52- 70
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	4/ மேற்கு	4/ மேற்கு	4/ மேற்கு	4/ மேற்கு	4/ மேற்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகமான மேகமூட்டம், இலேசான மழை மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர் / சாகுபடி சூழல்	பருவம் / சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனை
பாசிப்பயறு	விதைத்தல்	இறவையில் பாசிப்பயறு சாகுபடிக்கு மஞ்சள் தேமல் நோய்க்கு எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட இரகங்களான VBN 2, VBN 3 மற்றும் CO (Gg) 7 ஆகிய இரகங்களை தேர்வு செய்யவும். விதை நேர்த்தி செய்ய ஒரு பாக்கெட் (200 கிராம்/ எக்டர்) ரைசோபியம் சி.ஆர். எம். 6, ஒரு பாக்கெட் (200 கிராம்/ எக்டர்) பாஸ்போபாக்டீரியா மற்றும்

		<p>தாவர வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கும் பாக்கிரியா ஒரு பாக்கெட் (200 கிராம்/ எக்டர்) ஆகியவற்றுடன் ஆறிய கஞ்சி கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்கவும்.</p> <p>நடவு வயலில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நுண்உரக் கலவை எக்டருக்கு 5 கிலோவை ஊட்டமேற்றிய தொழுஉரமாக அளிக்கவும் (ஊட்டமேற்றிய தொழுஉரம் தயாரிக்க 1:10 என்ற விகிதத்தில் நுண்உரக் கலவை மற்றும் தொழுஉரத்தை கலந்து ஒரு மாதம் காற்றுப்புகாமல் வைத்திருக்கவும்).</p> <p>அடியுரமாக 25: 50: 25 கிலோ/ எக்டர் தழை, மணி மற்றும் சாம்பல் சத்துக்களை இடவும். மேலும் 20 கிலோ கந்தக சத்து மற்றும் 25 கிலோ ஜிங்க் சல்பேட் ஆகியவற்றை இடவும்.</p>
கத்தரி	பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவம்	<p>வரும் தினங்களில் மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் இறவை பயிர்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்வதை தவிர்க்கவும்.</p>
வாழை	பூமொட்டு உருவாகும் பருவம்	

குறுஞ்செய்தி:- ஜூன் 13, 14 & 17-ல் மழை: 12, 4 & 1 மி.மீ. பாசிப்பயறு விதைத்தல்- VBN 2, VBN 3 & CO(Gg)7 இரகங்களை தேர்வு செய்யவும், விதையளவு 20 கிலோ/எக்டர், இடைவெளி 30x 10 செ.மீ.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
கோவில்பட்டி