தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை

(மார்ச் 25-ம் தேதி முதல் மார்ச் 29-ம் தேதி வரை)

(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்,
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய வானிலை துறை)

முந்தைய வார வானிலை (20.3.15 - 23.3.15)

மழை (மி.மீ.)	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	30- 32
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	23- 25
வானம் (ஆக்டா)	3- 4
ஈரப்பதம் (08:30 மணி) (சதவீதம்)	88- 97
ஈரப்பதம் (17:30 மணி) (சதவீதம்)	70- 77
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	7- 19
காற்றின் திசை	110- 140

29.3.15 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன்னறிவிப்பு				
	நாள் 1 25.3.15	நாள் 2 26.3.15	நாள் 3 27.3.15	நாள் 4 28.3.15	நாள் 5 29.3.15
மழை (மி.மீ.)	0	0	3	3	8
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	33	33	33	33	32
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	25	25	25	25	25
வானம் (ஆக்டா)	2	3	5	5	6
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70- 85	70- 87	75- 90	78- 92	80- 93
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	12/ தென்கிழக்கு	12/ தென்மேற்கு	15/வடகிழக்கு	14/ வடகிழக்கு	10/ கிழக்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமூட்டம், இலேசான மழை மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர் / சாகுபடி சூழல்	பருவம் /சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனை
பருத்தி மிளகாய்	முதிர்ச்சி பருவம்	வரும் தினங்களில் இலேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்யப்பட்ட பருத்தி மற்றும் மிளகாயை பாதுகாப்பான இடத்தில் சேமிக்கவும்.
கரும்பு	தூர்கட்டும்	தூர்கட்டும் பருவத்திலுள்ள கரும்புக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை சொட்டு

	பருவம்	நீர்ப்பாசனம் மூலம் அளிக்கவும். நட்ட 210 - ம் நாள் வரை சொட்டு உரநீர்ப்பாசனம் அளிக்கலாம். ஒவ்வொரு முறையும் சொட்டு உரநீர்ப்பாசனம் அளிக்கும்போது 25 கிலோ தழைச்சத்து மற்றும் 8 கிலோ சாம்பல் சத்து என்ற அளவில் யூரியா மற்றும் வெள்ளை பொட்டாஷ் மூலமாக அளிக்கவும்.
வாழை	வளர்ச்சி பருவம்	வரும் தினங்களில் வறண்ட வானிலை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் 12 வாரங்கள் வயது கொண்ட வாழைக்கு மரம் ஒன்றுக்கு 12 லிட்டர் தண்ணீரை சொட்டு நீர்ப்பாசனம் மூலம் அளிக்கவும்.
கத்தரி	பூக்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலையில் கத்தரியில் தண்டு மற்றும் காய்த்துளைப்பானின் தாக்குதல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதனை கட்டுப்படுத்த பாதிக்கப்பட்ட தண்டுப்பகுதிகளை அகற்றவும். கார்பரில் 2 கிராம்/ லிட்டர் + நனையும் கந்தகம் 2 கிராம்/ லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
தக்காளி	காய்க்கும் பருவம்	தக்காளியில் காய்க்கும் பருவம் முக்கியமான பருவமாதலால் ஊட்டச்சத்துக்களை சொட்டு நீர்ப்பாசனம் மூலம் அளிக்கவும். 12- 61- 0 உரம் 1.14 கிலோ/ எக்டர், 13- 0- 45 உரம் 6.17 கிலோ/ எக்டர் மற்றும் யூரியா 2.8 கிலோ/ எக்டர் என்ற அளவில் பாசன நீருடன் சேர்த்து அளிக்கவும்.
கால்நடை பராமரிப்பு	குடற்புழு நீக்கம் மற்றும் நோய் மேலாண்மை	ஆடுகளுக்கு தேவையான குடற்புழு நீக்க மருந்தினை கொடுக்கவும். புறக்கடை கோழிகளுக்கு வெள்ளை கழிசல் நோய் (இராணிகட்) தடுப்பூசி போடவும்.

குறுஞ்செய்தி- மழை: மார்ச் 27- 29 வரை முறையே 3, 3& 8 மி.மீ. ஆடுகளுக்கு தேவையான குடற்புழு நீக்க மருந்தினை கொடுக்கவும். புறக்கடை கோழிகளுக்கு வெள்ளை கழிசல் நோய் (இராணிகட்) தடுப்பூசி போடவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
கோவில்பட்டி