தஞ்சாவூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(27.05.2015 முதல் 31.05.2015 வரை)
தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம்இ ஆடுதுறை – 612 101

போன் : 0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in - Fax: 0435 2472881

==

தேதி 26.05.15

கடந்த 4 நாளில் நிலவிய வானிலை (22.05.15 - 25.05.15)

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	35-37
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	28-29
மேக ஶீட்டம்	3
ஈரப்பதம் (%)	71-72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.)	4

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை				
	தேதி-1 27,05,15	தேதி-2 28,05,15	தேதி-3 29,05,15	தேதி-4 30,05,15	தேதி-5 31,05,15
மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	38	38	37	37	37
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	29	29	28	28	28
மேக ஶீட்டம்	3	3	3	3	3
ஈரப்பதம் (%)	55-70	55-70	58-72	58-72	58-72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ,மணிக்கு)	4	4	4	4	4
காற்றின் திசை	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு

- 27.05.15 முதல் 31.05.15 வரை வானம் சற்று மேகஶீட்டத்துடன் காணப்படும். மழை இல்லை.

வேளாண் அறிவுரைகள்

முக்கிய பயிர்கள் நெல்இ கரும்பு வாழை மற்றும் பருத்தி

நெல்தரிசு பருத்தி காய்பிடிக்கும் பருவம் ? எள் காய்பிடிக்கும் பருவம் ? நெல் நாற்றங்கால் தயார்செய்தல்

- குறுவை பருவத்திற்கு ஏற்ற நெல் இரகங்களான ஆடுதுறை 36 ? ஆடுதுறை 43 ? ஆடுதுறை 45 மற்றும் கோ 51 விதைகளை விதைப்பு செய்வதற்கு முன்பு விதை நேர்த்தி செய்வது அவசியம். நெல் விதைகளை கார்பென்டாசிம் மருந்து 1 கிலோ விதைக்கு 2 கிராம் அல்லது சூடோமோனாஸ் பாக்டீரியா 10 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து ஈர விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்க வேண்டும். இதனால் விதைகள் ஶீலம் பரவக் கூடிய நோய்களை கட்டுப்படுத்த முடியும்.

- கோடை நெற்பயிரில் தூர் கட்டும் பருவத்தில்இ 1 ஏக்கருக்குத் தழைச்சத்து உரமான 25 கிலோ யூரியாவையும்இ சாம்பல் சத்து உரமான 10 கிலோ முரியேட் ஆப் பொட்டாஷ் உரத்தினையும் கலந்து வயலில் சீராக தண்ணீர் வைத்து தூவவும்.

- சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள கோடை நெற்பயிரில் குலை நோய்த் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் 200 கிராம் , ஏக்கர் அல்லது கார்பென்டெசிம் 200 கிராம் , ஏக்கர் என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

- தற்பொழுது நிலவும் வானிலையின் காரணமாக கோடை நெற்பயிரில் இலையுறை கருகல் நோய் பரவலாக தென்படுகிறது இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு கார்பன்டெசிம் 200 கிராம் அல்லது புரோப்பிகோனோசோல் 200 மி.லி. மருந்தை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

இயக்குநர்