

தேனி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை
(24-08-2016 – 28-08-2016)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

தேதி: 23-08-2016



கடந்த கால வானிலை 19-08-2016 முதல் 22-08-2016 வரை

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	1
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	38-39
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25-27
மேக மூட்டம்	5-7
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	43-77
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	10-19

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 28-08-2016 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	24.08.16	25.08.16	26.08.16	27.08.16	28.08.16
	புதன்	வியாழன்	வெள்ளி	சனி	ஞாயிறு
மழை (மி.மீ)	0.5	2	2	4	4
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25	25	25	25	25
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	20	20	20	20	20
மேக மூட்டம்	6	6	6	6	6
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	75	75	75	75	75
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம்(சதவீதம்)	60	60	60	60	60
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	16	16	16	16	16
காற்றின் திசை	தெற்கு தென்கிழக்கு	தெற்கு தென்கிழக்கு	தெற்கு தென்கிழக்கு	தெற்கு தென்கிழக்கு	தெற்கு தென்கிழக்கு

குறுஞ்செய்தி

➤ எதிர்வரும் ஐந்து நாட்களில் இலேசான தூறல் சில இடங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. **எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்**

முக்கிய பயிர்கள்: நெல், வேர்க்கடலை, காய்கறி பயிர்கள், வாழை மற்றும் கரும்பு

பருவம்: நெல்: தண்டு உருளும் பருவம்

- குறுவை நெற்பயிரில் தூர்கட்டும் பருவத்தில், 1 ஏக்கருக்கு தழைச்சத்து உரமான 25 கிலோ யூரியாவையும், சாம்பல் சத்து உரமான 10 கிலோ முரியெட் ஆப் பொட்டாஷ் உரத்தினையும் கலந்து வயலில் சீராக தண்ணீர் வைத்து தூவவும்.
- நெற்பயிரில் இலைசிலந்தியின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைக்கோபால் 500 மி.லி./ஏக்கர் அல்லது நனையும் கந்தகத்தூள் 400 கிராம்/ஏக்கர் என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
- கொட்டகையின் மேற் பகுதியில் வைக்கோல் அல்லது தென்னாங்கித்து பரப்புவதன் மூலம் வெப்ப தாக்கத்தின் அளவை குறைத்து கொட்டகையின் உட்புறம் குளுமையாக வைத்து கொள்ளலாம்.