



மதுரை மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை
(08-12-2016 – 12-12-2016)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்



தேதி: 07-12-2016

கடந்த கால வானிலை 02-12-2016 முதல் 06-12-2016 வரை

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	51.4
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	26-32
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	19-24
மேக மூட்டம்	3-8
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	55-91
காற்றின் வேகம்(கி.மீ/மணி)	0-50

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 12-12-2016 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	08.12.16	09.12.16	10.12.16	11.12.16	12.12.16
	வியாழன்	வெள்ளி	சனி	ஞாயிறு	திங்கள்
மழை (மி.மீ)	0	0	0.5	0	0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	31	31	31	31	31
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	22	22	22	22	22
மேக மூட்டம்	5	5	5	5	5
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	75	75	75	75	75
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	65	65	65	65	65
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	10	10	10	10	10
காற்றின் திசை	வடகிழக்கு	வடகிழக்கு	வடகிழக்கு	வடகிழக்கு	வடகிழக்கு

குறுஞ்செய்தி

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. 10ம் தேதி மட்டும் லேசான தூரலுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது. லேசான மேகமூட்டத்துடன் கூடிய குளிர்ந்த வானிலையே நிலவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்
முக்கிய பயிர்கள் : பருத்தி, நெல் மற்றும் வாழை

- தற்போது நிலவும் மழை மற்றும் பனி மூட்டமான சூழ்நிலை காரணமாக நெல்லில் இலை சுருட்டுப்புழு தாக்குதலுக்கு வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த தாவர பூச்சிகொல்லியான அசாடிர்க்ஸின் 0.03 சதக் கரைசலை ஏக்கருக்கு 400 மி.லி. என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
- தற்போது நிலவும் குளிர்ந்த வானிலையின் காரணமாக பருத்தி செடியில் காணப்படும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு 5 என்ற அளவில் மஞ்சள் ஓட்டும் பொறி வைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம். தேவைப்படின் இமிடாகுளோபிரிட் 200 எஸ்.எல். ஒரு ஏக்கருக்கு 400 மி.லி. என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
- மிதமான மழையின் காரணமாக மண்ணில் உள்ள ஈரத்தை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களுக்கு உரம் மற்றும் நுண்ணூட்டங்களை வைப்பதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்
- மழைக்கால வானிலை நிலவுவதால், காய்கறிப் பயிர்களில் வேர் அழுகல் நோய் தாக்கக்கூடும். இதற்கு பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் கார்பென்பாசிம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 கிராம் என்ற விகிதத்தில் கலந்து ஊற்ற வேண்டும்.
- மழைகாலங்களில் தங்களது கால்நடைகளை கோமாரிநோய் தாக்குதல் ஏற்படும் மேலும் சப்பைநோய், தொண்டைஅடைப்பான் நோய் ,குடற்புழுக்கள் மற்றும் உருண்டைப்புழுக்கள் தாக்குதல் காணப்படும் இதன் காரணமாக மாடுகள், கன்றுகளில் கழிச்சல், வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும், இதனைத்தடுக்க மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் 3 மற்றும் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை குடற்புழுநீக்கம் செய்யவேண்டும்.