



தஞ்சாவூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(20.01.2016 முதல் 24.01.2016 வரை)
தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஆடுதுறை - 612 101
போன் : 0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in - Fax: 0435 2472881



தேதி : 19.01.16

கடந்த 5 நாளில் நிலவிய வானிலை (14.01.2016 – 18.01.2016)

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	0.0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	31
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	22
மேக மூட்டம்	4
ஈரப்பதம் (%)	70 – 80
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.)	2 – 3

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை				
	தேதி-1 20/01/16	தேதி-2 21/01/16	தேதி-3 22/01/16	தேதி-4 23/01/16	தேதி-5 24/01/16
மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0.5
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	31	31	31	31	31
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	22	22	22	22	22
மேக மூட்டம்	4	4	4	4	4
ஈரப்பதம் (%)	68 – 74	70 – 76	71 – 74	71 – 72	71 – 74
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணிக்கு)	3	3	3	3	3
காற்றின் திசை	கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு

20.01.2016 முதல் 24.01.2016 வரை வானம் சற்று மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும்படி காணப்படும். எதிர்பார்க்கப்படும் மழை அளவு 0.5 மி.மீ.

வேளாண் அறிவுரைகள் :

முக்கிய பயிர்: நெல்

சம்பா : அறுவடை பருவம் ; தாளடி: முதிர்ச்சி பருவம்

- ❖ அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை நிலையில் உள்ள சம்பா நெல்லினை அறுவடை செய்து நன்கு காய வைத்து ஈரத்தன்மை 13 சதவீதத்திற்கு கீழ் இருக்குமாறு சேமித்து வைத்து பூச்சிகள் இல்லாமல் பாதுகாக்கவும்.
- ❖ அறுவடை நிலையில் இருக்கும் முதிர்ந்த சம்பா நெல் வயல்களில் மெழுகு பதத்தில் நெல் தரிசு உளுந்து, பச்சைப்பயிறு விதைப்பதற்கு ஏற்ற தருணம். உளுந்து ஆடுதுறை 3 மற்றும் பச்சைப்பயிறு ஆடுதுறை 3 ஆகிய இரகங்கள் நெல் தரிசுக்கு ஏற்ற இரகங்கள்.
- ❖ பயிறு விதைகளை விதைப்பதற்கு முன் ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் சூடோமொனாஸ் அல்லது 4 கிராம் என்ற அளவில் டிரைக்கோகிரம்மா விரிடி என்னும் உயிரியல் நோய் தடுப்பினை கலத்தல் மூலம் விதை மற்றும் மண் மூலம் பரவும் நோய்களை தடுக்கலாம்.
- ❖ அடுத்து பயிறு விதைகளை விதைப்பதற்கு முன் உயிர் உரங்களான ரைசோபியம் 200 கிராம் + பிஜிபிஆர் 200 கிராம் + அசோஸ்பைரில்லாம் 200 கிராம் ஆகியவற்றை ஒரு ஏக்கருக்கு உண்டான விதையுடன் கலந்து விதைக்கவும்.

இயக்குநர்