



திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(07.09.2016 முதல் 11.09.2016 வரை)

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஆடுதுறை- 612 101
போன்: 0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in Fax: 0435 2472881



தேதி:06.09.16

கடந்த 4 நாட்களில் நிலவிய வானிலை (02.09.2016- 05.09.2016)

காரணிகள்	கடந்த நாட்களில் வானிலை
மழை (மி.மீ.)	10.0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C)	34-36
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C)	25-26
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	6-7
காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	62-69
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	13-18

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை				
	நாள் 1 07.09.2016	நாள் 2 08.09.2016	நாள் 2 09.09.2016	நாள் 4 10.09.2016	நாள் 5 11.09.2016
மழை (மி.மீ.)	2	0	2	0	5
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C)	35	35	35	35	35
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C)	25	25	25	25	25
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	6	6
காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42-58	42-58	42-58	42-58	42-58
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	13	13	13	13	13
காற்றின் திசை	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

07.09.2016 முதல் 11.09.2016 வரை வானம் இருள்கூழ்ந்து மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
எதிர்பார்க்கப்படும் மழை 2 - 5 மி.மீ.

வேளாண் அறிவுரைகள் :

பயிர் : நெல், உளுந்து, எள், கரும்பு மற்றும் பருத்தி

பருவம் : குறுவை : தண்டு உருளும் பருவம் சம்பா : நிலம் தயாரித்தல் மற்றும் விதைத்தல்.

- கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழையைப் பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை தயார் செய்யவும்.
- சம்பா வயல்களில் நேரடிவிதைப்பு செய்யும் பொழுது டிராக்டர் மூலம் இயங்கும் விதைக்கும் கருவிக்கு ஏக்கருக்கு 15 கிலோ மற்றும் ஆட்கள் கொண்டு தெளிக்கும் பொழுது ஏக்கருக்கு 30 கிலோ விதை அளவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. விதைப்பதற்கு முன் விதைகளை சூடோமோனாஸ் என்ற எதிர் உயிரியினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்கவும். இதனால் விதைகளின் முளைப்புத்திறன் மற்றும் வீரிய தன்மை அதிகரிக்கும். விதைகள் மூலம் பரவக்கூடிய நோய் கிருமிகள் அழிந்து விடும்.
- சம்பா நடவு செய்யும் விவசாயிகள் 1 ஏக்கருக்கு 200 கிலோ ஐப்சம், 10 கிலோ ஐங்லல்பேட், 15 கிலோ யூரியா, 40 கிலோ டிஏபி மற்றும் 10 கிலோ பொட்டாஷ் ஆகிய உரங்களை அடியுரமாக இடவேண்டும். சம்பா நடவிற்கு முன் ஏக்கருக்கு 100 கிலோ வேப்பம்புண்ணாக்கு இட்டு பூச்சி மற்றும் நூற்புழுக்களை கட்டுப்படுத்தலாம்.
- நேரடி விதைப்பு செய்த சேற்று வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் களை முளைக்கும் முன் களைக்கொல்லியான பிரிடிலாக்குளோர் + சேப்னர் ஏக்கருக்கு 500 மி.லி. என்ற அளவில் தெளித்து களைகளைக் கட்டுப்படுத்தவும்.

ஓம்/- வெ. இரவி.
இயக்குநர்

/உண்மை நகல்/

பேராசிரியர்(உழவியல்)