



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	2.0	3.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	30.0	30.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	24.0	23.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	96	93	94	91	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	59	66	68	62	47
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	5.0	6.0	7.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	103	98	216	288	297
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 60.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 7.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழுகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	33.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	25.0	24.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	95	93	93	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	57	66	66	58	49
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	8.0	8.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	97	84	241	308	308
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 60.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 7.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழுகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	33.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	25.0	24.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	95	93	93	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	57	66	67	58	49
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	8.0	8.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	89	76	241	308	308
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 60.0%), 30.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 7.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழுகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	3.0	2.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	32.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	24.0	24.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	94	92	93	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	57	65	66	58	48
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	6.0	8.0	8.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	101	112	228	292	305
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 57.0%), 32.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	33.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	25.0	24.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	95	93	93	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	58	67	67	59	49
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	8.0	8.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	62	50	234	310	307
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 54.0%), 32.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	33.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	24.0	23.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	94	92	92	90	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	60	64	51	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	5.0	6.0	7.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	134	142	253	270	307
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 54.0%), 32.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசிறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	33.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	23.0	24.0	24.0	21.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	94	92	92	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	62	65	54	45
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	6.0	7.0	7.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	129	129	248	281	308
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 57.0%), 32.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழுகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	33.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	25.0	24.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	95	93	93	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	57	66	66	58	49
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	9.0	7.0	8.0	9.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	121	105	248	308	308
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 56.0%), 32.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	30.0	33.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	24.0	23.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	93	92	92	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	60	64	50	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	6.0	7.0	7.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	163	157	246	264	313
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 54.0%), 32.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழுகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	33.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	25.0	24.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	95	93	93	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	58	67	67	59	49
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	8.0	8.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	68	58	234	309	307
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 57.0%), 32.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழுகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொடடியம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	33.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	24.0	23.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	93	92	92	90	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	54	59	64	51	43
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	5.0	6.0	6.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	136	146	253	266	307
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 54.0%), 32.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	30.0	32.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	24.0	25.0	24.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	94	92	92	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	62	65	53	47
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	8.0	8.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	203	173	274	295	311
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 57.0%), 32.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழுகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	30.0	33.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	24.0	23.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	94	92	92	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	61	64	51	45
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	7.0	7.0	7.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	197	176	259	274	314
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 53.0%), 32.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 02-12-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-02 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-03	2022-12-04	2022-12-05	2022-12-06	2022-12-07
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	31.0	31.0	32.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	24.0	23.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	95	92	93	90	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	57	65	66	59	47
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	6.0	7.0	7.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	105	112	228	288	301
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	6	5	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 56.0%), 32.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (07.12.2022 முதல் 13.12.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (2.93 மி.மீ. லிருந்து 4.37 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் நெல்லில் குலைநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த டிரைசைக்ளோசோல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் இலைவழி தெளிப்பானாக தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவும் பருவச் சூழ்நிலையில் வாழைப் பயிரில் பனாமா வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. வாழையில் முதலில், அடிப்புற இலைகளில் குறிப்பாக இலை ஓரங்கள், மஞ்சள் நிறமாகி வாடிக் காய்ந்துவிடும். தாக்குதல் அதிகரிக்கும் போது, மரத்தின் உச்சிச் இலைகள் விறைப்பாக மாறும். அடி இலைகள், இலைக்காம்புடன் ஒடிந்து தண்டைச் சுற்றி தொங்கும். நடும் போது ஆரோக்கியமான பக்கக் கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். பயிர் சுழற்சி முறையை கையாளவும். நெல், கரும்பு பயிர்களை ஒரிருமுறையும் அதை தொடர்ந்து வாழையினை இரண்டு மூன்று முறையும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய வேண்டும், சரியான உரம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை கையாள வேண்டும். நல்ல வடிகால் அமைப்பை ஏற்படுத்தவும். ஒரு ஹெக்டருக்கு 2½ கிலோ என்ற அளவில் சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லியை தொழு உரம் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து மண்ணில் இடவேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறி ஆடுகளில் வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளை நீக்க 2 மில்லி பூட்டாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து ஆடுகளின் வெளிப்புறங்களில் பூச வேண்டும்.
பசு	தற்போது இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆடு, மாடு குறிப்பாக இளம் கன்றுகளை திறந்த வெளியில் விடக்கூடாது. இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்பமூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பறவையின்	கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் இறக்கை அழுகல் மற்றும் குடல்புண் நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது என தெரியவந்துள்ளது. எனவே, பண்ணையாளர்கள் கோழிக்கு அளிக்கப்படும் தீவனத்தில் நுண்ணுயிர் கிருமிகளான கிளாஸ்டிரியம், ஸ்டெபிலோகாக்கஸ் மற்றும் ஈகோலை ஆகியவற்றின் தாக்கம் உள்ளதா என பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் தீவன மேலாண்மை முறைகளைக் கையாளுமாறும், தீவனத்தில் பூஞ்சை நச்சுக்களின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் பூஞ்சை நச்சு தடுப்பான் உபயோகிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று. வயல்களில் போதுமான வடிகால் வசதி செய்யவும்.