



தமிழ்நாடுவேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் - ஆடுதுறை

அரியலூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

(23.07.2022 முதல் 27.07.2022)



அறிக்கை எண்: 58/2022

தேதி: 22.07.2022

அரியலூர் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 °செ முதல் 37 °செ ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 °செ முதல் 27 °செ ஆகவும் பதிவானது.

அரியலூர் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (23.07.2022 முதல் 27.07.2022)

கடந்த வார வானிலை (19.07.2022 முதல் 21.07.2022)			காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலைமுன்னறிவிப்பு (23.07.2022 முதல் 27.07.2022) வரை				
நாள்-1 19/07	நாள்-2 20/07	நாள்-3 21/07	தேதி	நாள்-1 23/07	நாள்-2 24/07	நாள்-3 25/07	நாள்-4 26/07	நாள்-5 27/07
0	0	0	மழை (மி.மீ.)	10	7	7	8	7
35	37	37	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	34	35	35	35	35
26	27	26	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	25	27	27	26	26
4	4	6	மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8
67-40	69-49	71-42	அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70-40	70-40	60-50	70-50	60-50
15	14	13	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7	8	8	8	8
வட மேற்கு	வட வட மேற்கு	வட மேற்கு	காற்றின் திசை	தென் மேற்கு	மேற்கு தென் மேற்கு	மேற்கு தென் மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

அரியலூர் மாவட்டத்திற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலும் மிதமான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 23.07.2022, முதல் 27.07.2022 ஆகிய தினங்களில் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34 °செ முதல் 35 °செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 °செ முதல் 27 °செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 50 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 7-8 கி.மீ. அளவுக்கு பெரும்பாலும் மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது	வரும் நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்யும் என்பதால் விவசாயிகள் வயல்களில் உள்ள பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு தவிர்க்கலாம் அல்லது மிதமான அளவில் தண்ணீர் பாய்ச்சலாம்
நெல்	குறுவை நெற்பயிரில் 40ம் நாள் கைக்களை எடுக்கவும்.

நெல்		தற்போது நிலவும் தட்பவெப்பநிலையின் காரணமாக தண்டு துளைப்பானின் தாக்கம் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த குளோர்பைரிபாஸ் 20 இசி 500 மி.லி / ஏக்கர் அல்லது புரொபனோபாஸ் 50 இசி 400 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
கால்நடைகள்	ஆடு மற்றும் மாடு	பருவ மழை தொடங்குவதற்கு முன்னர் கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய்க்கான தடுப்பூசி அளிப்பதனை உறுதி செய்து கொள்ளவும்.

குறுஞ்செய்தி

குறுவை நெற்பயிரில் 40ம் நாள் கைக்களை எடுக்கவும்.

இயக்குநர்