



தமிழ்நாடு வளோண்மமைப் பல்கலைக்கழகம்
வளோண் அறிவியல் நிலையம் - கடலூர்
இந்திய வானிலை மையம், இந்திய வளோண் ஆராய்ச்சி கழகம் இணைந்து வழங்கும்-
வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனகைகள்- கடலூர் மாவட்டம்
மாவட்ட வளோண்மை வானிலை பிரிவு (DAMU)

01.06.2022-05.06.2022

Dated: 31.05.2022

வானிலை முன்னறிவிப்பு சூருக்கம்

04.06.2022 அன்று மிக இலசோன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மகேமட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் ஈரப்பதம் 75-80% ஆகவும், பகல் நேரங்களில் 65-70% ஆக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38.0-40.0 °C ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27.0-28.0 °C ஆகவும் இருக்கும். காற்றின் வகேமானது மணிக் கு 12.0 கி.மீ ஆக தறெகு திசையில் இருந்து தன்மறெகு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொதுவான வானிலை ஆலோசனகைகள்

விவசாயிகள் பயிர்களுக்கு முறையான வாடிகால் வசதி அமைக்கவும் மற்றும் பயிர்களுக்கு மண்ணின் ஈரத்தன்மையை பொறுத்து நீர்பாசனம் செய்யவும்.

நெல்

தற்பொழுது நிலவிவரும் சூழ்நிலையில் நெல் நாற்றங்காலில் இலபைபனே தாககம் தன்பட்டால் தயாமீதாகக்கஷம் 25% WG 100 கிராம்/எக்டர் அல்லது டமைத்யோட் 1.5 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் தளெிக்கவும்.

கரும்பு

1. கரும்பு பயிரில் மாவும்புச்சி மற்றும் பொக்கா போங்க தாககம் காணப்படுகிறது. இதனால் பயிர்களின் வளர்ச்சி குன்றி மற்றும் குறுத்து காயந்து காணப்படும். இதனை கட்டுப்படுத்து இமிடாக்ளோப்ரிட் 17.8 SL 0.6 மி.லி/லி அல்லது கார்பென்டாசிம் 1.0 கி/லி என்ற அளவில் தளெிக்கலாம்.
2. தற்பொழுது நிலவிவரும் சூழ்நிலையில் கரும்பில் இளங்குறுத்து புழுவின் தாககம் தன்பட்டால் அதை கட்டுப்படுத்து குளோரான்டிரனிலிப்ரோல் 18.5 SC (0.5 மி.லி/ லிட்டர்) அல்லது பிப்ரோனில் 5 % SC (2 மி.லி/ லிட்டர்) என்ற அளவில் தளெிக்கவும்.

நிலக்கடலலை

நிலக்கடலையில் வரேழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துதல் கார்பன்டீசம் 2.0 கிராம்/ கி.கி விதகைக்கு என்ற அளவில் விதை நரேத்தி செய்யவும் அல்லது டர்கைக்கோ டரெமா விரிடி 4.0 கிராம்/கி.கி விதை மற்றும் பசேலாஸ் சப்டில்லஸ் 10 கிராம்/கி.கி விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நரேத்தி செய்து பயிரிடலாம்.

தனென்னை

1. பசு தடவிய மஞ்சள் நிறப்பாலித்தீன் தாள்களவை மரத்தலை சூற்றிகட்டி மூதிரந்த ஈக்களவை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
2. வளென்னை ஈக்கள் அதிகளவு பரவும் போது என்கார்ஸியா ஒட்டுண்ணிகள், காக்ஸினெல்லிட் ஒட்டுண்ணிகள் / பொறிவண்டுகள் மற்றும் கிரைசோபெர்லா இரவைவிழுங்கிகள் ஆகிய நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் தோப்புகளில் இயற்கையாகவே உருவாக ஆரம்பிக்கும். என்கார்ஸியா ஒட்டுண்ணிகள் அதிக அளவு உருவாகி வளென்னை ஈக்களின் சதேத்தலை 40 முதல் 70% அளவுக்கு குறைக்கின்றது.
3. அதிகபாதிப்பின் போது ஒரு லிட்டர் நீருக்கு வபேப்பெண்ணெய் 20 மிலி அல்லது அசாடிராக்டின் 1.0% EC 2.0 மிலி/லிட்டர் தண்ணீரில் மருந்தலை ஒரு லிட்டருக்கு 1.0 மி/லி ஒட்டும் திரவத்துடன் கலந்து தனென்னை ஓலையின் அடிப்புறம் தளெளிக்கவும்.