



தமிழ்நாடு வேளாண் மைப் பல்கலைக் கழகம்
&
இந்தியவானிலைத் துறை
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச் சிமையம், கோவை
கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்
அறிக்கை
(07.09.2022 முதல் 11.09.2022)



அறிக்கை எண் 071/2022

தேதி.06.09.2022

மாநிலத் தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 26° செ முதல் 35° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 21° செ முதல் 26° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 17° செ முதல் 21° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 11° செ முதல் 13° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

| கடந்தவார வானிலை | | | | தேதி | அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன் ஏறிவிப்பு 11.09.2022- 08.30 வரை | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | | நாள்-1 07/09 | நாள்-2 08/09 | நாள்-3 09/09 | நாள்-4 10/09 | நாள்-5 11/09 |
| 29.8 | 5.0 | 4.9 | 13.4 | மழை (மி.மீ) | 25 | 35 | 15 | 8 | 6 |
| 30 | 32 | 33 | 34 | அதிக பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ) | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| 22 | 23 | 23 | 23 | குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ) | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 7 | 5 | 6 | 6 | மேக மூட்டை (ஆக்டா) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 85 | 78 | 76 | 81 | அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 66 | 63 | 69 | குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 9 | 10 | 14 | 12 | காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 200 | 200 | 230 | 200 | காற்றுவீசும் திசை | 230 | 250 | 230 | 230 | 230 |

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை கோயமுத்தூர் (07.09.2022 முதல் 11.09.2022)

வரும் நாட்களில் வானம் இலோசான மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். அடுத்து வரும் ஐந்து நாட்களுக்கு இலோசனது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31° செ முதல் 32° செ ஆகவும், குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 21° செ முதல் 23° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும்

கிழக்கு திசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை வீசக்கூடும்.

கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு

| தேதி | ஆணையளை | அன்னூர் | காரமெட | கிணத்துக்கடல் | மதுக்கண | பேரியநாயக்கனா பாளையம் | பொள்ளாச்சி வடக்கு | பொள்ளாச்சி தெற்கு | சாக்கார் சாமக்குளம் | கல்தான் பெட் | தூவார் | தொண்டராமுத்தூர் |
|------------|--------|---------|--------|---------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------|
| 07-09-2022 | 40 | 39 | 48 | 32 | 27 | 32 | 37 | 37 | 30 | 31 | 29 | 30 |
| 08-09-2022 | 79 | 58 | 75 | 60 | 53 | 56 | 71 | 71 | 52 | 49 | 48 | 59 |
| 09-09-2022 | 19 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 17 | 17 | 12 | 10 | 11 | 15 |
| 10-09-2022 | 19 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 11-09-2022 | 25 | 9 | 10 | 15 | 13 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 10 | 14 |

வேளாண் அறிவுரைகள்

| | | |
|--------------|------------------------------|---|
| பொது அறிவுரை | | அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழையுடன் காற்றின் வேகம் 8 – 16 கி.மீ வரை எதிர் பார்க்கப்படுபிற்கு. பயிர்களுக்கு நீர்ப்பசனம் செய்வதனை ஒத்திவைக்க வேண்டும். உயரமான பயிர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு போதிய பாதுகாப்பு செய்யவேண்டும். கடந்த வார மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினைப் பயன்படுத்தி மானாவாரி கரிசல் நிலங்களை முன்பருவ விஷைப்பிற்கு தயார் படுத்தவும். |
| நெல் | வளர் மற்றும் பூக்கும் பருவம் | பூக்கும் பருவத்தை அடைந்த குறுவை நெல் பயிருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 30 கிலோ யூரியா மற்றும் 10 கிலோ மியூரேட் பொட்டாஷ் உரத்தை மேலுரமாக இடவேண்டும். மேலுரம் இடப்பட்ட வயலில் நீர் வடிக்க வேண்டாம். எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினைப் பயன்படுத்தி சம்பா நடவிற்கு நாற்றாங்கால் தயார் செய்யவும். மழை பெற வாய்ப்புள்ளதால் கார் பருவத்தில் நடவு செய்த நெற்பயிர்கள் பால் பிடிக்கும் தருணம் முதல் அறுவடை தருணத்தில் உள்ளதால், தகுந்த வடிகால் வசதி செய்யவும். |
| பருத்தி | விஷைப்பு | மன் ஈரப்பதத்தினை பயன்படுத்தி இறவையில் நடப்பட்ட குளிர் கால கம்போடியா பருத்தி மற்றும் மக்காச்சோளத்தில் அதிகப்படியான பயிர்களை களைந்து பயிர் எண்ணிக்கையை |

| | | |
|------------|------------------------------|--|
| மஞ்சள் | வினதப்பு மற்றும் வளர் பருவம் | மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் மஞ்சளில் தக்க வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும் மண்ணின் அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் மேக மூட்டத்தின் காரணமாக மஞ்சளில் கிழங்கு அழுகல் நோய் வரவாய்ப்புள்ளதால் 1 சத போர்டாக்ஸ் கரைசல் (அ) 0.25 சத காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு கரைசலை தூரில் ஊற்றுவதன் மூலம் நோய் பரவாமல் தடுக்கலாம். |
| கரும்பு | | காற்றின் வேகம் அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்பட்ட மற்றும் நடுபட்டங்களில் பயிரிடப்பட்ட கரும்பிற்கு தோகை உரித்து விட்டம் கட்ட வேண்டும். |
| வாழை | | மழையுடன் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 16 கிமீ விட அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் 5 மாதத்திற்கு மேல் வயதுடைய வாழைக்கு ஊன்று கொடுக்க வேண்டும். மேலும் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இனாம் பண்டிகைக்கான பழங்கள் அறுவடை செய்யப்பட்ட பின் வாழை மரங்களை தூருடன் வெட்டி சாய்த்து துண்டுகளாக்கி இயற்கை உரமாக்க வேண்டும். |
| கால்நடைகள் | | மாடுகளை குளக்கரைகளில் புதிதாக முளைத்த தாவரங்களை மேய்ச்சலுக்கு விட வேண்டாம். இதனால் வரக்கூடிய துள்ளுமாறி நோயைத் தவிர்க்கலாம். நிலவும் பருவகால வானிலை கோமாரி நோய் (கால் மற்றும் வாய்ச்சப்பை நோய்) தாக்குதலுக்கு ஏற்றதாக காணப்படுவதால் அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையில் கால்நடைகளுக்கு தடுப்புசி போட்டுக் கொள்ளுமாறு அறிவுருத்தப்படுகிறார்கள். காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழி மற்றும் மாட்டுத்தீவனங்களில் பூஞ்சாணை நச்ச பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் தீவனங்களை பரிசோதித்து நச்ச இல்லா நல்ல தீவனங்களைக் கொடுக்கவும். |

குறுஞ் செய்தி

- ஒனாம் பண்டிகைக்கான பழங்கள் அறுவடை செய்யப்பட்ட பின் வாழை மரங்களை தூருடன் வெட்டி சாய்த்து துண்டுகளாக்கி இயற்கை உரமாக்க வேண்டும்.