



தமிழ்நாடு வேளாண் மைப் பல்கலைக் கழகம்
&
இந்தியவானிலைத் துறை
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச் சிமையம், கோவை
கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்
அறிக்கை
(28.09.2022 முதல் 02.10.2022)



அறிக்கை எண் 077/2022

தேதி.27.09.2022

மாநிலத் தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 31° செ முதல் 38° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 22° செ முதல் 29° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 19° செ முதல் 21° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 9° செ முதல் 13° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்தவார வானிலை				தேதி	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னிவிப்பு 02.10.2022- 08.30 வரை				
23/09	24/09	25/09	26/09		நாள்-1 28/09	நாள்-2 29/09	நாள்-3 30/09	நாள்-4 01/10	நாள்-5 02/10
0.0	0.0	0.3	1.3	மழை (மி.மீ)	20	4	4	0	4
33	33	33	33	அதிக பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	33	34	35	35	35
22	22	22	23	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	23	24	24	25	25
5	6	6	6	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	8	4	4
78	78	80	82	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
63	67	64	64	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	40	40	50	50	50
19	16	10	15	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	9	10	12	10	10
230	200	230	200	காற்றுவீசும் திசை	250	260	260	240	240

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை கோயமுத்தூர் (28.09.2022 முதல் 02.10.2022)

வரும் நாட்களில் வானம் இலோசன மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். அடுத்து வரும் ஐந்து நாட்களுக்கு இலோசன தூறல் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33° செ முதல் 353° செ ஆகவும், குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 23° செ முதல் 25° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 90 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 40 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக

கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு

தேதி	ஆணமலை	அங்ணார்	காரமெட	கிணத்துக்கடல்	மதுக்கரை	பெரியநீரயக்கன	பாளையம்	போளாச்சி	வடக்கு	போளாச்சி	தெற்கு	சாக்கார்	சாமக்குமாம்	கல்தான்பெட்	தீவுர்	தொண்டராமுத்தூர்
28-09-2022	12	13	13	14	16	16	16	13	13	13	15	13	14	16		
29-09-2022	1	3	3	2	1	2	1	1	1	1	2	3	3	1		
30-09-2022	10	1	2	5	3	2	8	8	8	2	2	2	2	4		
01-10-2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02-10-2022	7	2	3	4	3	2	5	5	5	2	3	2	3	2	3	

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது அறிவுரை		<p>அடுத்த 5 நாட்களுக்கு லேசான மழையுடன் காற்றின் வேகம் 9-12 கி.மீ வரை எதிர் பார்க்கப்படுகிறது. பயிர்களுக்கு மண் ஈரத்தினைப்பொறுத்து நீர்பாசனம் செய்ய வேண்டும்.</p> <p>கடந்த வார மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினைப் பயன்படுத்தி மானாவாரி கரிசல் நிலங்களை முன்பருவ விதைப்பிற்கு தயார் படுத்தவும்.</p> <p>இலேசான தூறலே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் மானாவாரி மற்றும் இறைவையில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலக்கடலை மற்றும் தானியப்பயிர்களை அறுவடை செய்து வெய்யிலில் காயவைத்து சேமிக்கவும்.</p>
நெல்		தற்பொழுது நிலவும் வானிலையால் நெல்லில் இலைமடக்குப்புழு வர வாய்ப்புள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் வயலை நன்கு கண்காணித்து தாக்குதல் தென்பட்டால் குளோாரானிப்புரோல் என்ற மருந்தை 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 0.3 மில்லி கலந்து தெளிக்கவும்.
நிலக்கடலை		ஒரு சில இடங்களில் நிலக்கடலையில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் தென்படுகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த இமிடாகுளோபிட் என்ற மருந்தை 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி வீதம் கலந்து தெளிக்கவும்.
தென்னை		போதுமான மழை பெறப்படின் அல்லது ஈரம் இருக்கும் பட்சத்தில் தென்னை தோப்புக்குள் பசுந்தாள் உரங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் மண்ணின் ஈரத்தை உயர்த்தலாம்.

பூர்வை அல்லது கணம் அறங்கம் பொறுத்து கொண்டுவரும் பருத்தி செடிகளில் அதிகமான தழை வளர்ச்சியை தடுத்து பூக்களை அதிகப்படுத்த 15 வது இடைக்கணுவுக்கு மேல்ஸ்ன் பகுதியை கிள்ளி விடவும். மேலும் பூ உதிர்வதை தவிர்க்க நாப்தலின் அசிடிக் அமிலம் 40 மில்லி கிராமம் 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து நடவு செய்த 60 முதல் 90 வது நாளில் தெளிக்கவும்

தக்காளி	நடவு	நிலவும் சதாகமான வானிலையில் தக்காளியில் இலைகோட்டுப்பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த 5 சதவேப்பங்கொட்டை சாற்று கரைசலை மழையில்லா நேரங்களில் தெளிக்க வேண்டும்.
மஞ்சள்	விஷதப்பு மற்றும் வளர்ப்புவும்	<p>இறைவு மஞ்சளில் நூண்ணுரட்டச்சத்து குறைபாடு தென்படவாய்ப்புள்ளது. இதனை தவிர்க்க ஒரு எக்டருக்கு 250 லிட்டர் தண்ணீரில் பெரஸ்சல்பேட், ஜிங்சல்பேட், போரக்ஸ் மற்றும் யூரியா ஓவ்வொன்றும் 375 கிராம் கலந்து தெளிக்கவும். 25 நாட்கள் இடைவெளியில் இரண்டு முறை தெளிக்கவும்.</p> <p>மேல் மூட்டத்துடன் தூறலும் கலந்து காணப்படுவதால் ஒரு சில இடங்களில் மஞ்சளில் இலைப்புள்ளி நோய் வரவாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் இதை கண்காணித்து நோய் தென்பட்டால் குளோரோதளாளில் 2 மில்லி அல்லது புரோபிக்கோணாஸோல் 2கி என்ற மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.</p> <p>ஒருசில இடங்களில் தொடர்ந்து வறண்ட வானிலை காணப்படுவதால் மஞ்சளில் இலைப்பேன் தாக்குதல் காணப்படுகிறது. எனவே விவசாயிகள் இதை கண்காணித்து தாக்குதல் தென்பட்டால் டைமெத்தையேட் என்ற மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 2மிலி கலந்து தெளிக்கவும்.</p>
கரும்பு	வளர்ப்புவும்	<p>கோவை மாவட்டத்தில் மழையுடன் காற்றின் வேகம் அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முன்பட்ட மற்றும் நடுபட்டங்களில் பயிரிடப்பட்ட கரும்பிற்கு தோகை உரித்து விட்டம் கட்ட வேண்டும்.</p> <p>வரும் ஐந்து நாட்களில் தூறல் மழை மட்டுமே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பின்பட்ட கரும்பிற்கு இரண்டாவது தவணையாக ஒரு எக்கருக்கு 85கிலோ யூரியா மற்றும் 25கிலோ பொட்டாஷ் உரம் இட்டு மண் அணைக்க வேண்டும். மண் ஈரத்தினைப்பொறுத்து நீர்பாசனம் செய்ய வேண்டும்.</p>
வாழை		மழையுடன் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 9-12 கி மீ விட அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் 5 மாதத்திற்கு மேல் வயதுடைய வாழைக்கு ஊன்று கொடுக்க வேண்டும். மேலும் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
கால்நடைகள்		<p>மாடுகளை குளக்கரைகளில் புதிதாக முளைத்த தாவரங்களை மேய்ச்சலுக்கு விட வேண்டாம். இதனால் வரக்கூடிய துள்ளுமாறி நோயைத் தவிர்க்கலாம்.</p> <p>நிலவும் பருவகால வானிலை கோமாரி நோய் (கால் மற்றும் வாய்ச்சப்பை நோய்) தாக்குதலுக்கு ஏற்றதாக காணப்படுவதால் அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையில் கால்நடைகளுக்கு தடுப்புச் சீபோட்டுக் கொள்ளுமாறு அறிவுருத்தப்படுகிறார்கள்.</p> <p>காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக காணப்படுவதால் கோழி மற்றும் மாட்டுத்தீவனங்களில் பூஞ்சாணை நச்சு பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் தீவனங்களை பரிசோதித்து நச்சு இல்லா நல்ல தீவனங்களைக் கொடுக்கவும்.</p>

- போதுமான மழை பெறப்படின் அல்லது ஈரம் இருக்கும் பட்சத்தில் தென்னை தோப்புக்குள் பசுந்தாள் உரங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் மண்ணின் ஈரத்தை உயர்த்தலாம்.

முதன் மை அலுவலர் (GKMS)
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச் சிமையம்
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை