



தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் - ஆடுதுறை  
களுர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

(10.09.2022 முதல் 14.09.2022)



அறிக்கை எண்: 72/2022

தேதி: 09.09.2022

களுர் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை  $33^{\circ}\text{C}$  முதல்  $35^{\circ}\text{C}$  ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை  $25^{\circ}\text{C}$  ஆகவும் பதிவானது. மேலும் ஆங்காங்கே மழை பெறப்பட்டது.

களுர் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (10.09.2022 முதல் 14.09.2022)

கடந்த வார வானிலை (06.09.2022 முதல் 08.09.2022)			காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலைமுன்னாரிவிப்பு (10.09.2022 முதல் 14.09.2022) வரை				
நாள்-1 06/09	நாள்-2 07/09	நாள்-3 08/09	தேதி	நாள்-1 10/09	நாள்-2 11/09	நாள்-3 12/09	நாள்-4 13/09	நாள்-5 14/09
14.9	0.0	0.0	மழை (மி.மி.)	8	6	4	4	4
35	34	33	அதிகபட்ச வெப்பநிலை ( $^{\circ}\text{C}$ )	34	34	34	35	35
25	25	25	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ( $^{\circ}\text{C}$ )	25	25	25	25	25
6	7	7	மேகமுட்டம் (ஆக்டா)	5	5	4	4	4
84-56	76-65	67-65	அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈர்ப்பதம் (%)	70-55	70-55	70-55	70-55	70-55
19	19	22	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	10	10	10	10	10
மேற்கு	தென் மேற்கு	தென் மேற்கு	காற்றின் திசை	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

களுர் மாவட்டத்திற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலும் மிதமான மேகமுட்டத்துடன் காணப்படும். 10.09.2022 முதல் 14.09.2022 வரை மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை  $34^{\circ}\text{C}$  முதல்  $35^{\circ}\text{C}$  ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை  $25^{\circ}\text{C}$  ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈர்ப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈர்ப்பதம் 55 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10 கி.மீ. அளவுக்கு பெரும்பாலும் மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

## வேளாண் அறிவுரைகள்

<b>பொது</b>	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்பதால் வயல்களில் முறையான வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும்.	
<b>நெல்</b>		நெல் நாற்றங்காலில் விதைகள் இடம்பெயர்தலை தவிர்க்க, விதைத்த 2 நாட்களுக்கு மாலை வேலையில் மிதமான அளவில் தண்ணீர் பாய்ச்சவும்.
		நெல் நாற்றங்காலில் ஒரு சென்ட்க்கு 2 கிலோ வீதம் ட.எ.பி மேலுரமாக இடவேண்டும். நெல் நாற்றங்காலில் இலைப்பேனை தவிர்க்க விதைத்த 10 நாட்களுக்குள் அசார்டிராக்டின் 0.03 சதம் (3 மி.லி/லி) ஓட்டும் திரவமான காதி கோபுர பார் சோப் 3 கிராம் / லி என்ற அளவில் கலந்து நாற்றங்கால் நன்கு நனையும் படி கைத்தெளிப்பான் கொண்டு காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் தெளித்தல் அவசியம்.
<b>பொது</b>	உழவர் பெருமக்கள் அனைவரும் தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தால் பரிந்துரைக்கப்படும் வேளாண் சார்ந்த செயலிகளை பதிவிற்கக்கம் செய்து பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளபடுகிறார்கள் (TNAU AAS, Meghdoot and DAMINI).	
<b>கால்நடைகள்</b>	<b>மாடு மற்றும் ஆடு</b>	வைக்கோல் மற்றும் மக்காச்சோளம் போன்ற தீவன பொருட்களை வெயில் உலர்த்தி கால்நடைகளுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்சின் தாக்கத்தில் இருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்கலாம்.

## ஹுஞ்செய்தி

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்பதால் வயல்களில் முறையான வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும்.

**இயக்குநர்**