



தமிழ்நாடு வேள்மைப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் - ஆடுதுறை  
தஞ்சாவூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேள்மை அறிக்கை  
(10.09.2022 முதல் 14.09.2022)



**அறிக்கை எண்: 72/2022**

**தேதி: 09.09.2022**

**தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை**

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை  $31^{\circ}\text{C}$  முதல்  $32^{\circ}\text{C}$  ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை  $24^{\circ}\text{C}$  முதல்  $26^{\circ}\text{C}$  ஆகவும் பதிவானது. மேலும் ஆங்காங்கே மழை பெறப்பட்டது.

**தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (10.09.2022 முதல் 14.09.2022)**

கடந்த வார வானிலை (06.09.2022 முதல் 08.09.2022)			காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலைமுன்னியிப்பு (10.09.2022 முதல் 14.09.2022) வரை				
நாள்-1 06/09	நாள்-2 07/09	நாள்-3 08/09		தேதி	நாள்-1 10/09	நாள்-2 11/09	நாள்-3 12/09	நாள்-4 13/09
2.8	9.0	5.2	மழை (மி.மி.)	4	8	6	4	4
32	32	31	அதிகபட்ச வெப்பநிலை ( $^{\circ}\text{C}$ )	34	34	34	35	35
26	24	25	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ( $^{\circ}\text{C}$ )	26	26	26	26	26
8	7	7	மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	5	5	4	4	4
80-76	82-73	82-67	அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75-65	75-65	75-65	75-65	75-65
4	4	4	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	12	12	12	12
மேற்கு தென் மேற்கு	மேற்கு தென் மேற்கு	மேற்கு தென் மேற்கு	காற்றின் திசை	தென் தென் மேற்கு	தென் தென் மேற்கு	தென் தென் மேற்கு	தென் தென் மேற்கு	தென் தென் மேற்கு

**தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கான வானிலை சார்ந்த வேள்மை அறிக்கை**

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலும் மிதமான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 10.09.2022 முதல் 14.09.2022 வரை மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை  $34^{\circ}\text{C}$  முதல்  $35^{\circ}\text{C}$  ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை  $26^{\circ}\text{C}$  ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 75 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 65 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12 கி.மீ. அளவுக்கு பெரும்பாலும் தென் தென் மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கடும்.

## வேளாண் அறிவுரைகள்

<b>பொது</b>	வரும் நாட்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்பதால் வயல்களில் முறையான வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும்.	
<b>நெல்</b>		<p>நெல் நாற்றங்காலில் விதைகள் இடம்பெயர்தலை தவிர்க்க, விதைத்த 2 நாட்களுக்கு மாலை வேலையில் மிதமான அளவில் தண்ணீர் பாய்ச்சவும்.</p> <p>நெல் நாற்றங்காலில் ஒரு சென்ட்கு 2 கிலோ வீதம் ட.ஏ.பி மேலுரமாக இடவேண்டும். நெல் நாற்றங்காலில் இலைப்பேணை தவிர்க்க விதைத்த 10 நாட்களுக்குள் அசார்டிராக்டின் 0.03 சதம் (3 மி.லி/லி) ஒட்டும் திரவமான காதி கோபுர பார் சோப் 3 கிராம் / லி என்ற அளவில் கலந்து நாற்றங்கால் நன்கு நனையும் படி கைத்தெளிப்பான் கொண்டு காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் தெளித்தல் அவசியம்.</p>
<b>பொது</b>		உழவர் பெருமக்கள் அனைவரும் தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தால் பரிந்துரைக்கப்படும் வேளாண் சார்ந்த செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளபடுகிறார்கள் (TNAU AAS, Meghdoot and DAMINI).
<b>கால்நடைகள்</b>	<b>மாடு மற்றும் ஆடு</b>	வைக்கோல் மற்றும் மக்காச்சோளம் போன்ற தீவன பொருட்களை வெயில் உலர்த்தி கால்நடைகளுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்சின் தாக்கத்தில் இருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்கலாம்.

## குறுஞ்செய்தி

வரும் நாட்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்பதால் வயல்களில் முறையான வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும்.

**இயக்குநர்**