



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 22-08-2023

தி -நீல்கிரிஸ்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-08-22 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-08-23	2023-08-24	2023-08-25	2023-08-26	2023-08-27
மழையளவு (மி.மீ)	12.0	9.0	3.0	7.0	23.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	20.0	19.0	19.0	19.0	18.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	10.0	9.0	9.0	8.0	8.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	60	60	60	70
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6	6	4	4	4
காற்றின் திசை (கோணம்)	270	270	250	270	270
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும்.முதல் இரண்டு மற்றும் கடைசி இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழையும், மூன்றாவது நாளுக்கு லேசான மழையும் பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 18- 20°செஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 8-10°செஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 90 சதவிகிதமாகவும். மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 60-70 சதவிகிதமாகவும் இருக்கும்.சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 04-06 கி.மீஅளவுக்கு வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தொடர் மழை காரணமாக, காய்கறி பயிருக்கு உபரி நீரை வெளியேற்ற வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். பூண்டு குமிழ் விளைச்சலை அதிகரிக்க நடவு செய்த 30, 45 மற்றும் 60 நாட்களில் நீரில் கரையக்கூடிய நுண்ணூட்டச் சத்து கலவையை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 0.50 கிராம் என்ற அளவில் இலையில் இடலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

உருளைக்கிழங்கு பயிரில் இலை கருகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த, நடவு செய்த 45, 60 மற்றும் 75 நாட்களில் மான்கோசெப் @ 2 கிராம்/லி அல்லது குளோரோதலோனில் @ 2 கிராம்/லி என்ற அளவில் இலைவழி தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
இஞ்சி	இஞ்சி மென்அழுகல் மேலாண்மை, போதுமான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி, ஆரோக்கியமான மற்றும் நோய் இல்லாத விதை வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, விதை வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகளுக்கு மான்கோசெப் அல்லது காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு @ 3 கிராம்/லி அல்லது 200 பிபிஎம் ஸ்ட்ரெப்டோசைக்ளின் மூலம் 30 நிமிடங்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கவும். வயலில், பாத்திகளை காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு @ 2.5 கிராம்/லி அல்லது 1% போர்டாக்ஸ் கலவையுடன் நனைக்கவும்.