| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை**<br>இணைந்து வழங்குபவர்கள்<br>பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை<br>ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்<br>ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் | | | | |
| மாவட்டம் : | மதுரை | காலம் : | 23/08/2023 | முதல் 27/08/2023 |
| அறிக்கை எண் : | 067/ 2023 | வெளியீட்டு நாள் : | 22/08/2023 | |

## மதுரை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

**பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது.**

| கடந்தவார வானிலை (17.08.2023 முதல் 21.08.2023) | | | | | | அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு – 27-08-2023- 08.30 வரை | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | தேதி | நாள்-1 23/08 | நாள்-2 24/08 | நாள்-3 25/08 | நாள்-4 26/08 | நாள்-5 27/08 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | மழை (மி.மீ) | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 37 | 39 | 38 | 39 | 37 | அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்) | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்) | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | மேக மூட்டம் (ஆக்டா) | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 71 | 66 | 62 | 57 | 57 | அதிக மற்றும் குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்) | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 37 | 44 | 40 | 42 | 39 | | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 7 | 10 | 13 | 8 | 7 | காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| தென் கிழக்கு | வட மேற்கு | வட மேற்கு | வட கிழக்கு | வட கிழக்கு | காற்றின் திசை | வட மேற்கு | தென்மேற்கு | தெற்கு | தெற்கு | தென்மேற்கு |

### குறுஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் ஆகஸ்ட் 23 தேதி மிதமான மழையும் மற்றும் 24, 25, 26, 27ம் தேதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 25°-27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 6 முதல் 8 கி.மீ வேகத்தில், வடமேற்கு, தென்மேற்கு மற்றும் தெற்கு திசைகளிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் ஆகஸ்ட் 23 தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு. விவசாயிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக்குட்டைகள் மற்றும் நீர்நிலைகளை சரிசெய்து மழைநீர் சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும். இந்த காலகட்டத்தில், உரமிடுதல் மற்றும் பூச்சிமருந்து தெளிக்கும் வேலைகளை ஒத்தி

தவேயான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளும்படியும், கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வெளியில் அனுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டகைகளில் கட்டி வகைக்கும்படியும் கட்டேுகொள்ளப் படுகிறார்கள்.

மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் ஆகஸ்ட் 23 மற்றும் 24ம் ததேி இடி மின்னலுடன் கூடிய லசோனது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பரோது பரோதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வெளியயே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டகைகளில் கட்டி வகைக்கும் படியும் கட்டேுகொள்ளப்படுகிறார்கள்.

### எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கறே்ற வளோண் ஆலோசனைகள்
### முக்கிய பயிர்கள் : நலெ், பருத்தி, கால்நடை.

### நலெ்:

நறெ்பயிரில் தற்பரோது இலைக்கருகல் நரோயின் தாக்குதல் பரவலாக தனெ்படுகின்றது. இது பரெும்பாலும் நறெ்பயிர் நட்ட 3-4வது வாரங்களில் தரோன்றுகிறது.

இந்நரோய் ஒருவகை பாக்டீரியாவால் உண்டாகின்றது, இது முழுச் சடெியயைோ அல்லது ஒரு சில இலைகளையைோ வாடச் சய்ெயும், இலைகள் மஞ்சள் நிறமாகி பின்னர் கருகியது பரோன்று தரோன்றும். பாசன நீர், மழை மற்றும் காற்று மூலம் பரவுகிறது. பறித்த நாற்றின் சதேமடைந்த வரேின் மூலமாக பாக்டீரியாக்கள் நறெ்பயிரின் உட்புகுந்து பயிரதை் தாக்குகின்றன.

இந்நரோயினை கட்டுப்படுத்த 5 சத வபே்பங்கொட்டைச் சாறு அல்லது 3 சத வபே்பண்ணயெ் கரைசல் அல்லது 10 சத வபே்பம் பிண்ணாக்குச் சாறு அல்லது 20 சத சாணக்கரைசல், இவைகளில் ஏதனேும் ஒன்றை நரோய் தரோன்றும் தருணத்திலும் மீண்டும் 10 நாட்கள் இடைவளெியில் மறுமுறையும் தளெிக்க வணே்டும்.

### பருத்தி:

பருத்தியில் உள்ள ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை சரிசய்ெய, பருத்தி பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் விதைத்த நாளிலிருந்து 10-15 நாட்களுக்குள் நுண்ணூட்டச் சத்துக்களை இடவணே்டும். ஏக்கருக்கு 5 கிலோ பருத்தி நுண்ணூட்டம் அல்லது 20 கிலோ மகெனீசியம் சல்படேட் உரத்தினை வைத்து நுண்ணூட்டசத்து குறைபாட்டினை நிவர்த்தி சய்ெயலாம்.

மலேும் மக்கிய தொழு உரத்துடன் ஏக்கருக்கு 2 கிலோ அசரோஸ்பைரில்லம் மற்றும் 2 கிலோ பாஸ்பரோ பாக்டீரியாவை கலந்து இடுவதன் மூலம் சிறந்த பயிர் வளர்ச்சியுடன் நல்ல மகசூலை பறெலாம்.

### கால்நடை:

விவசாயிகள் தங்களது பசு மாடுகளுக்கு பசுந்தீவனம் மற்றும் வைக்கோலை காலையில் பாதியளவும் மாலையில் பாதியளவும், பால் கறந்த பின்பு அளிக்க வணே்டும்.

தீவனங்களையும், தீவன அளவையும் திடீர் என்று மாற்றுதல் கூடாது. சிறிது சிறிதாக மாறுதல் சய்ெதல் வணே்டும். நீளமான மற்றும் கடினமான தண்டுகளுடைய தீவனங்களை புல்வடெ்டி கொண்டு சிறு துண்டுகளாக வடெ்டிப் பரோட வணே்டும்.

இளம் குழை மற்றும் புற்களை உலர்த்தி வைக்கரோலுடன் கலந்து அளிக்கல் நல்லது

பதன புறகளை (சலைஜே) பால கறவை முட்நத பிறகும அடர த்வனததை சர்பாதியாக காலை மற்றும் மாலையிலும் அளிக்க வணேட்டும்.