



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா
இந்திய வானிலை துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 26-12-2023

தி -நீல்கிரிஸ்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-12-26 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-12-27	2023-12-28	2023-12-29	2023-12-30	2023-12-31
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	20.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	11.0	10.0	10.0	9.0	8.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	40	60	60	60	60
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	8	8	6	6
காற்றின் திசை (கோணம்)	90	90	110	110	110
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	6	6	6	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இருந்து மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். முதல் மற்றும் இரண்டாவது நாளில் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை எனவும், மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது நாளில் மிக லேசான மழையும் பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 20-22°செஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 8-11°செஆகவும் இருக்கக்கூடும். காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80-90 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 40- 60 சதவிகிதமாகவும் இருக்கக்கூடும்.சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 06-08 கி.மீஅளவுக்கு வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

குருமிளகாயில் வாடல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த, விவசாயிகள் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு @ 0.2% (மண்ணை அள்ளாதல்) அல்லது பொட்டாசியம் பாஸ்போனேட் @ 0.3% அல்லது மெட்டாலாக்சில் @ 0.1% பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மழை இல்லாத நேரங்களில் தெளிக்க வேண்டும்.

குறுஞ்செய்தி :

உருளைக்கிழங்கு பயிரில் இலை கருகல் நோயைக் கட்டுப் படுத்த, நடவு செய்த 45, 60 மற்றும் 75 நாட்களில் மான்கோசெப் @ 2 கிராம்/லி அல்லது குளோரோதலோனில் @ 2 கிராம்/லி என்ற அளவில் இலைவழி தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தேயிலை	தேயிலைப் பயிரில் கொப்புள நோயைக் கட்டுப்படுத்த: அ. பஞ்சகவ்யா மற்றும் தசகவ்யா 2% (1 & 2 வது தெளித்தல்) ஆ. காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு 2 கிராம் / லிட்டர் தெளிக்க வேண்டும். (3 வது தெளித்தல்) இ. பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் 5 கிராம் / லிட்டர் 7 நாட்கள் இடைவெளியில் (4 வது தெளித்தல்)மழை இல்லாத நேரங்களில் தெளிக்க வேண்டும்.
பூண்டு	பூண்டு குமிழ் விளைச்சலை அதிகரிக்க நடவு செய்த 30, 45 மற்றும் 60 நாட்களில் நீரில் கரையக்கூடிய நுண்ணூட்டச் சத்து கலவையை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 0.50 கிராம் என்ற அளவில் இலையில் இடலாம். மழை இல்லாத நேரங்களில் தெளிக்க வேண்டும்.