



பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்,
காரைக்கால் & இந்திய வானிலைத்துறை
காரைக்கால் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(11.02.2023 முதல் 15.02.2023 வரை)

தொ. எண் (அலுவலகம்): 04368 – 261182

E-mail: agrnaas2012@gmail.com தொ. நகல் (அலுவலகம்): 04368-261260



அறிக்கை எண்: 012 (02) PJN/GKMS/2023

தேதி: 10.02.2023

காரைக்கால் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்த வார வானிலை (05.02.2023 முதல் 09.02.2023 வரை)					வானிலை காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு -15.02.2023 – 8.30 மணி நேரம் வரை				
05/02	06/02	07/02	08/02	09/02		நாள்-1 11/02	நாள்-2 12/02	நாள்-3 13/02	நாள்-4 14/02	நாள்-5 15/02
0	0	0	0	0	மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
29	30	30	30	31	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	29	30	30	30	31
21	21	21	20	21	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	22	22	23	23	23
4	4	4	4	4	மேக மூட்டம்	4	4	3	2	2
72-89	67-93	64-94	65-94	60-93	ஈரப்பதம் (%)	50-80	50-80	50-80	50-90	50-90
3	3	2	2	2	காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	8	10	12	12	14
வடக்கு வட கிழக்கு	வடக்கு வட மேற்கு	வடக்கு வட கிழக்கு	வடக்கு வட மேற்கு	வடக்கு வட மேற்கு	காற்றின் திசை	வட கிழக்கு	கிழக்கு வட கிழக்கு	கிழக்கு வட கிழக்கு	கிழக்கு	வடக்கு

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (11.02.2023 முதல் 15.02.2023 வரை):

❖ பிப்ரவரி 11 லிருந்து 15 வரை வறண்ட வானிலை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.



அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்ப நிலை 22-31 டி.செ, மாலை மற்றும் காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 50-90 சதவிகிதமாகவும், காற்றின் வேகம் 08-14 கி.மீ அளவுக்கு பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்றானது பெரும்பாலும் கிழக்கு வட கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.



பிப்ரவரி 15 லிருந்து 21 வரை மழை இயல்பிற்கு (0.77 மி.மீ) குறைவாகவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை (32.20 டி.செ) இயல்பாகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (18.84 டி.செ) இயல்பிற்கு குறைவாகவும் இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

வேளாண் அறிவுரை

பயிர்கள் / கால் நடைகள்	பருவம்/ விவரங்கள்	வேளாண் ஆலோசனைகள்
பச்சைப் பயிறு	விதைத்தல்	நெல் தரிசு பயிறு வகையான ADT 3 யை ஹெக்டேருக்கு 25 கிலோ என்ற அளவில் பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரம் வரை விதைக்கலாம். நெற்பயிரை இயந்திரம் மூலம் அறுவடை செய்யும் போது ஏழு நாட்களுக்கு முன்னரே விதைகளை விதைக்கவும்.
நெல்	அறுவடை	நெற் வயலில் வடிகால் அமைத்து, மழை நீரை வடித்து, அறுவடை செய்தபின் நெல்லை 14-16 சதவிகித ஈரப்பதத்தில் சேமித்து வைக்கவும்.

ஆடு	அம்மை நோய்	வெயில் காலத்தில் ஆடுகளுக்கு அம்மை நோய் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே ஆடு வளர்ப்போர் தங்கள் ஆடுகளுக்கு அம்மை நோய் வரமால் தடுக்க வெயில் காலத்திற்கு முன்பாகவே அம்மை தடுப்பூசி போட வேண்டும்.
-----	------------	--

குறுஞ்செய்தி: நெல் தரிசு பயிறை பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரம் வரை விதைக்கலாம்.

முதல்வர்