



**தமிழ்நாடுவேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்**  
**தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் - ஆடுதுறை**  
**பெரம்பலூர்மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை**  
**(08.02.2023 முதல் 12.02.2023)**



**அறிக்கை எண்: 11/2023 தேதி: 07.02.2023**

**பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை**

பெரும்பாலானபகுதிகளில் அதிகபட்சவெப்பநிலை 25 - 31 °செ ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்சவெப்பநிலை 20 - 22 °செஆகவும்பதிவானது. மேலும் ஆங்காங்கே மழை பெறப்பட்டது.

**பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (08.02.2023 முதல் 12.02.2023).**

**பெரம்பலூர் மாவட்டத்திற்கானவானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை**

கடந்த வார வானிலை (03.02.2023 முதல் 06.02.2023)				காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலைமுன்னறிவிப்பு (08.02.2023 முதல் 12.02.2023) வரை				
நாள்-1 03/02	நாள்-2 04/02	நாள்-3 05/02	நாள்-4 06/02	தேதி	நாள்-1 08/02	நாள்-2 09/02	நாள்-3 10/02	நாள்-4 11/02	நாள்-5 12/02
1.3	7.5	0	0	மழை (மி.மீ.)	0	0	0	0	0
25	28	30	31	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	30	31	31	32	32
22	22	21	20	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21	21	22	22	22
8	6	5	6	மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	4	3	2	2	2
86-84	91-57	88-44	86-61	அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90-30	90-30	90-30	80-30	80-30
11	15	17	10	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4	10	8	12	10
வட வட கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு	காற்றின் திசை	வட வட கிழக்கு	கிழக்கு வட கிழக்கு	கிழக்கு வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	கிழக்கு வட கிழக்கு

வரும் நாட்களில் வானம் குறைந்த மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 08.02.2023 முதல் 12.02.2023 ஆகிய தினங்களில் மழை இல்லை. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 - 32 °செஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21 - 22 °செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80-90 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேரகாற்றின் ஈரப்பதம் 30 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 4 - 10 கி.மீ. என்ற அளவுக்கு பெரும்பாலும் கிழக்கு வட கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

## வேளாண் அறிவுரைகள்

:

பொது		மழை நீர் தேங்கி உள்ள வயல்களில் வடிகால் வசதி செய்து நெல் வயல்களை காயவிட்டு அறுவடை செய்யவும்.
நெல்	அறுவடை	வறண்ட வானிலையை பயன்படுத்தி நெல் ஈரப்பதம் காய்ந்தவுடன் நெல் வயல்களை அறுவடை செய்யவும்.
பயறு வகைகள்	விதைப்பு	நெல் அறுவடை செய்த தரிசு நிலங்களில் உளுந்து மற்றும் பச்சைப்பயிறு விதைக்கவும்.
பயறு வகைகள்	விதைப்பு	ஒரு கிலோ பயறு விதைக்கு பியூவேரியானா பேசியானாவை 10 கிராம் என்ற வீதத்தில் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்கவும்.
கால்நடைகள்	மாடு மற்றும் ஆடு	இரவு நேர வெப்பநிலை குறைந்து காணப்படுவதால் நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே இரவு நேரங்களில் கொட்டகைகளில் வெப்ப மூட்டிகளை பயன்படுத்தவும்.

### குறுஞ்செய்தி

வறண்ட வானிலையை பயன்படுத்தி நெல் வயல்களை அறுவடை செய்யவும்.

இயக்குநர்