
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்சத்திரம் விதவை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	திண்டிவக்கல்	காலம்	21/06/2023	மாதல்		25/06/2023
	அறிக்கை எண் :	049/ 2023	வெளியீட்டு நாள்	20/06/2023			

திண்டிவக்கல் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°-41° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேமும் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (15.06.2023 மாதல் 19.06.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மாணன்றிவிப்பு - 25-06-2023- 08.30 வரவை					
15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	ததே	நாள்-1 21/06	நாள்-2 22/06	நாள்-3 23/06	நாள்-4 24/06	நாள்-5 25/06
0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	மழவை (மி.மீ)	6	6	8	8	2
40	41	41	38	35	அதிக பட்ச வெப்பநிலவை (சலெல்)	37	36	35	34	34
27	26	27	27	27	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலவை (சலெல்)	27	26	25	25	24
4	3	5	7	6	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8
54	54	57	60	70	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	70
43	35	45	63	48	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	8	10	10	12	10
8	8	9	8	2	காற்றின் திசவை	மறேக	தனெம் றேக	மறேக	மறேக	தனெம் றேக
வட மறேக	மறேக	வட மறேக	தனெ கிழக்க	தனெம் றேக	காற்றின் திசவை	மறேக	தனெம் றேக	மறேக	மறேக	தனெம் றேக

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓர் சில இடங்களில் ஜூன் 21, 22 ததே லசோன மழவையும் மற்றும் 23, 24 ததே மிதமான மழவைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலவையானது 34°-37° செல்சியவ ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலவையானது 22°-25° செல்சியவ ஆகவும் பதிவாகலாம். வான மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிக்க 10 மாதல் 12 கி.மீ வகேத்தில், மறேக மற்றும் தனெம்றேக திசவைகளிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலமைன்னறிவிப்பு (23-29 ஜூன் 2023):

மழைப்பொழிவு :

23-06-2023 - 29-06-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரும் வாரத்திற் மாவட்டத்தில் இயல்பை விட சற்று கூடுதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 29-06-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது ஒட்டியே காணப்படும். 32° செல்சியஸ் முதல் 36° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 29-06-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பானது முதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 20° செல்சியஸ் முதல் 24° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஓரிரா இடங்களில் ஜூன் 21, 22, 23, 24 மற்றும் 25ம் ததேிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லசோனது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பதேது பதேதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளியே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கட்டகைகளில் கட்டி வகைகும் படியும் கட்டகொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழைப் பொழிவு பெறப்பட்டுள்ளதாலும், அடூத்த சில நாட்களுக்கு மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதாலும் விவசாயிகள் உழவு செய்தல் மற்றும் நிலம் தயாரித்தல் வலேகைகளுக்கு திட்டமிடலாம். ஏற்கனவே தயார் நிலையில் உள்ள நிலங்களில் விதைப்பு \ நடவு செய்யும் பணிகளை துவங்கலாம். மலேம் விவசாயிகள் தாரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக் கூட்டகைகள் மற்றும் நீர் நிலகைகளை சரி செய்து மழை நீர் சகேரிப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளமாறு கட்டகக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மருந்து துளிக்கும் வலேகைகளை சிறிது காலத்திற்கு ஒத்தி வகைக்கவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளோண் ஆலோசனைகள்
மாக்கிய பயிர்கள் : தக்காளி, பாகற்காய், கால்நடை.

தக்காளி:

தக்காளி பயிரில் இலகை சூரூட்டகை நலேய் தாக்கூதல் பரவலாக துன்படுகின்றது. நலேய் தாக்கூதலின் அறிகுறியாக பூதிதாக வளரூம் தக்காளி சடெடியில் மஞ்சள் நிறத்தில் இலகை சூரூண்டு காணப்படும். தாவரத்தின் வளர்ச்சி காறறைந்துவிடும்.

புதிய இலகைளின் அளவு கூறறந்து சூரூங்கி, நரம்புகள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறியு காரணப்படும். இலகைள் மலே நகோக்கி சூரூண்டு பார்ப்பதற்கு கிண்ணம் பகால் இரூக்கம்.

மலர்கள் தகூன்றும் ஆனால் காய் பிபிப்பிற்கு மூன் உதிர்ந்துவிடும்.

இதனகை கட்டுப்படுத்த 10 லிட்டர் தண்ணீரூக்கு 250 மில்லி நன்கு பூளித்த மகூர், 40 கிராம சூடகூமகூனஸ், மற்றும் 2 மூட்டயின் வகூள்ளகைக்கூரூ ஂன்ற விகித்தில் நன்கு கலந்து தகூளிக்கவூம்.

பாகற்கூய்:

பாகற்கூய் பயிரில் ததூதுப் பூச்சியின் தூக்கூதல் பரவலாக தகூன்படலாம்.

இதனகை கட்டுப்படுத்த 10லி தண்ணீரூக்கு 40கிராம் சூடகூமகூனாஸ், 300மி நன்கு பூளித் தயிர் இவறூறுடன் 20மி ககூழி மூட்டயின் வகூள்ளகைக்கூரூ சகூரூத்து கலந்து தகூளிக்கவூம்.

கால்நடகூ:

கால்நடகூ வகூர்ப்பில் விவசாயிகள் மூடகூகூக்கு தினமூம்; 2 மூதல் 3 கிராம் வரகூ இடலிக்கூ பகூடப்படும் சகூடா உப்பூம், 15 மூதல் 20 கிராம் வரகூ சமயலூக்கூ உபயகூகிக்கூம் உப்பூ தீவனத்தூடன் சகூரூத்து அளித்து வந்தூல், பாலில் ஂஸ்.ஂன்.ஂப். ஂன்ற ககூழூப்பற் திடப்பகூரூட்களின் அளவு அதிகரிக்கூம்.