



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியாரசத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்					
மாவட்டம் :	மதுரை	காலம் :	24/06/2023	மாதல்	28/06/2023
அறிக்கை எண் :	050/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	23/06/2023		



மதுரை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரொம்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், காறனைந்தப வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (18.06.2023 மாதல் 22.06.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களாக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு - 28-06-2023- 08.30 வரலை					
18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	ததே	நாள்-1 24/06	நாள்-2 25/06	நாள்-3 26/06	நாள்-4 27/06	நாள்-5 28/06
0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	மழலை (மி.மீ)	8	6	8	6	6
38	35	37	37	36	அதிக பட்ச வெப்பநிலலை (சலை)	39	38	38	37	37
27	27	27	27	26	காறனைந்த பட்ச வெப்பநிலலை (சலை)	25	24	24	23	23
7	6	6	7	4	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	6	7	7	8
60	70	64	65	57	அதிக மற்றும் காறனைந்த பட்ச காற்றினி ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	70	70	70	70
63	48	49	50	40	காற்றினி வகேம் (கி.மீ/மணி)	40	40	40	40	40
8	2	10	6	6	காற்றினி திசலை	8	8	6	6	10
தனெ கிழக்க	தனெம றேகா	வட மறேகா	தனெ கிழக்க	கிழக்க	காற்றினி திசலை	வட மறேகா	மறேகா	மறேகா	மறேகா	மறேகா

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஜூன் 24, 26 ததே மிதமான மழலையம் மற்றும் 25, 27, 28 ததே லசோன மழலைகா வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலலையானது 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், காறனைந்தபட்ச வெப்பநிலலையானது 23°-25° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வால பொதுவாக மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிக்கா 6 மாதல் 10 கி.மீ வகேத்தில், வடமறே மற்றும் மறேகா திசலைகளிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பபாது ஆலலோசனலை

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலலைமான்னறிவிப்பு (23-29 ஜூன் 2023):

மழலைப்பபாழிவு :

23-06-2023 - 29-06-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்பி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தி டுயல்பலை விட சற்று காறவைன மமலை பெய்ய வாய்ப்பு.

மழைப்பொழிவு :

30-06-2023 - 06-07-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தி மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று கூடுதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 29-06-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்ப ஓட்டியே காணப்படும். 30° செல்சியஸ் மாதல் 34° செல்சியஸ் வரை இரக்க வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

30-06-2023 - 06-07-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்ப ஓட்டியே காணப்படும். 28° செல்சியஸ் மாதல் 34° செல்சியஸ் வரை இரக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 06-07-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்ப ஓட்டியே காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இரக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஓரிரா இடங்களில் ஜூன் 24 மற்றும் 25ம் ததே இடி மின்னலுடன கூடிய லசோனது மாதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆட்களன கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பதே பதேதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளன மறேகொள்ளவாம். இந்த காலகட்டத்தில் காலநடைகளை மயேச்சலுக்கு வெளியே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கட்டைகளை கட்டி வகைகும் படியும் கட்டைகொள்ளப்படுகிறார்கள்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளோண் ஆலசோனகைள்

மாக்கிய பயிர்கள் : கத்திரி, மல்லிகை, காலநடை.

கத்திரி:

கத்திரி பயிரில் சிறுநிலை நயேய தாக்குதல் பரவலாக தனென்படக்கூடும். இவற்றி தாக்குதலால் கத்தரிச் சடெயின் இலகைள் சிறுத்தும், இலகைக் காம்புகள் நீளம் காறறைந்த காணப்படும். அளவாக்கு அதிகமான இலகைள், சடெயின் நானிக் காருத்தில் தளேன், வளர்ச்சிக் கான்றிய சடெயாக தளேற்றமளிக்கும். மலர்கள் இலகை பளேன்ற அமபைப்பாக மா விடும், காய்கள் காய்ப்பது அறிதாகி விடும்.

நயேய தாக்கப்பட்ட சடெிகளைப் பிடாங்கி அப்பாறப்படுத்த வளேண்டும்.

இதனை கட்டப்படுத்த 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 6 மில்லி என்ற அளவில் இமிடாகளபிரகை உடன் 10 மில்லி ஓட்டும்பசகை கலந்து இலகைவழித் தளென்பாக தளெளிகக வளேண்டும்.

மல்லிகை:

மல்லிகை பூப்பயிரில் தண்டும் மற்றும் வரே அழகல் நயேயத் தாக்குதல் பரவலா தனென்படலாம். இந்நயேய தாக்குதலின் அறிகுறியாக தாவரங்களின் எல்லா நிலகைளில தளேற்று ஏற்படும்.

மாதலில் மாதிரந்த இலகைள் மஞ்சள் நிறமாக மாறும் பின் இளம் இலகைள் மஞ்சளாக இறுதியில் தாவரம் இறந்துவிடும். மலேம் வரே பகதியில் கராப்பு நிறமாற்றம் தனென்படும்.

இதனகை கட்டுப்படுத்த ஒரு லிட்டர் தண்ணீர்க்கு 2½ கிராம் என்ற அளவில் காப் ஆக்ஸிகுளரடை மரூந்தினகை கலந்து சடுபியின் தூர்பகூதியில் ஊற்ற வணீடும்.

கால்நடை:

கால்நடைகளைத் தாக்கும் தடுண்டை அடபைபான் நடுயானது படுரூம்பாலும் மழை காலங்களிலயே மிகூதியாக காணப்படுகிறது. கறவலை மாடுகள் கூறிப்பாக ஂரூமை மாடுக கலப்பினப் பசூக்கள் இந்நடுயால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன.

இந்நடுய தாக்கிய கால்நடைகளுக்கு கடுமயான காய்ச்சல் ஏற்படுவதுடன் தலை, கழூத் தடுண்டை, மார்பு படுன்ற பகூதிகளில் வீக்கமும் ஏற்படும்.

இந்த நடுயின் கிரூமிகள் ஈரப்பதமான மற்றும் நீர் நிறைந்த நிலமைகளில் நீண்ட கால உயிர்வாழும்.

இதனை தவிர்க்க மூன்னசெசரிக்கலை நடவடிக்கயாக மழகை காலத்திற்கு மூன்படு அரூகி உள்ள கால்நடை மரூத்தூவரலை அணூகி மாடுகளுக்கு தடுப்பூசி படுடுவது அவசியம் ஆகும்.