
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சின்னலை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்சத்திரம் விதலை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	திண்டிவக்கல்	காலம் :	30/09/2023	மாதல் :		04/10/2023
	அறிக்கை எண் :	078/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	29/09/2023			

திண்டிவக்கல் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (24.09.2023 மாதல் 28.09.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மாண்னறிவிப்பு -04-10-2023- 08.30 வரலை					
24/09	25/09	26/09	27/09	28/09	ததே	நாள்-1 30/09	நாள்-2 01/10	நாள்-3 02/10	நாள்-4 03/10	நாள்-5 04/10
1.0	2.4	0.9	1.6	7.3	மழலை (மி.மீ)	14	3	3	5	4
38	37	35	36	38	அதிக பட்ச வெப்பநிலலை (சலை)	36	35	35	35	35
25	26	25	24	25	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலலை (சலை)	26	25	25	25	24
4	5	6	4	5	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	8	7
70	68	64	68	59	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	80	70
41	50	49	84	48	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	40	50	50	50	40
6	6	4	7	10	காற்றின் திசலை	10	8	8	6	8
தன் மறேக	மறேக	வட மறேக	வட மறேக	வட மறேக	காற்றின் திசலை	தன்ம றேக	தன்ம றேக	தன்ம றேக	மறேக	வட மறேக

காறூசயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓர் சில இடங்களில் சபெட்டம்பர் 30 ததே மிதமான மழலையும் மற்றும் அக்டடோபர் 1, 2, 3, 4ம் ததேகளில் லசோன மழலைகக வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலலையானது 35°-36° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலலையானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பதாவாக மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிகக 6 மாதல் 10 கி.மீ வகேத்தில், தன்மறேக, மறேக மற்றும் வடமறேக திசலைகளிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பதாவ ஆலலோசனலை:

மழைப்பொழிவு :

29-09-2023 - 12-10-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட கூடதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

29-09-2023 - 12-10-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 26° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரலை இரூக்க வாய்ப்பு.

கூறறந்தபட்ச வெப்பநிலை :

29-09-2023 - 12-10-2023: மாவட்டத்தில் கூறறந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொரூத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும் காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரலை இரூக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் செப்டம்பர் 30 ததேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு. விவசாயிகள் தூரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக்கூட்டகைள் மற்றும் நீர்நிலகைளை சரிசெய்து மழைநீர் சகேரிப்பு நடவடிக்ககைளை மறேக்கொள்ளுமாறும். இந்த காலகட்டத்தில், உரமிடூதல் மற்றும் பூச்சிமரூந்து தளெிக்கூம் வலேகைளை ஒத்தி வகைக்கூம்படியும், விளறைநிலங்களில் மழைநீர் தளேக்கி பயிர்களை சதேப்படூத்தாத அளவில் தவேயைான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படூத்தி கொள்ளும்படியும், கால்நடகைளை மயேச்சலூக்கூ வளெயில் அனுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக ககொட்டககைளில் கட்டி வகைக்கூம்படியும் கடேடூககொள்ளப் படூகிறாரககள்.

மகேமூட்டத்துடன் கூடிய ஈரப்பதமான வானிலலை நிலவூவதால் விவசாயிகள் மஞ்சள் நிற ஒட்டுபொறி வதைத்து சாறு உறிஞ்சூம் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தயைும், ஊதா நிற ஒட்டுபொறி அட்டலை வதைத்து அசூவினி மற்றும் இலதைதுளலைப்பான் நடமாட்டத்தயைும் கண்காணிக்கவூம்.

அடூத்த 5 நாட்களூக்கூ மணிக்கூ 6 மாதல் 10 கி.மீ. வகேத்தில் காற்று வீசூம் என எதிர்பார்க்கப்படூவதால் விவசாயிகள் கரூம்பூ, வாழலை, பப்பாளி, ககொய்யா, மூரூங்கலை போன்ற பயிர்ககூ மண் அனதைத்தல், மூட்டூககொடூத்தல், விட்டம் கட்டூதல் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்ககைளை மறேக்ககொள்ளவூம். ககொடிவகலை பயிர்களில் பந்தல்களில் தூரூபிடீத்து பழூதடறந்துள்ள கம்பிககள் மற்றும் தூண்களை கண்டறிந்து சரி செய்யவூம். போதூமான மூட்டூகளை ககொடூக்கவூம். பயிர்ககூ மரூந்து தளெிக்கூம் வலேகைளை ஒத்திவகைக்கவூம்.

எதிர்பார்க்கப்படூம் வானிலலைக்கறேற வளேண்ண ஆலகேசனகைள் மூக்கிய பயிர்ககள் : பரூத்தி, மல்லிகலை, கால்நடலை.

பரூத்தி:

பரூத்தி சாகூபடி சயெய்யம் விவசாயிகள் மூதல் உரமாக கலப்பு உரம் வதைத்தல் மிகவாம் நல்லது. ஓரூ ஏக்கரூக்கூ சூப்பர்பாஸ்படே 150 கிலகூ அமகூனியம் சல்படே 40 கிலகூ பபுட்டாஷ் 35 கிலகூ இவகை மூன்றையாம் கலந்து சடிககூ அரூகில் வதைத்து மூடிவிட வணேடும். அல்லது 150 கிலகூ 20-20 உரம் 30 கிலகூ பபுட்டாஷ் ஆகியவற்றகை கலந்து சடிககூ அரூகில் வதைத்து மணமூடி தண்ணீர் பாய்ச்ச வணேடும்.

மல்லிககை :

மல்லிககை பூப்பயிரில் தண்டூ மற்றும் வரேர் அழகல் தூக்கூதல் பரவலாக தனென்புகின்றது. நகூய் தூக்கூதலின் அறிகூறியாக தூவரங்கலின் எல்லா நிலகைலும் தகூற்று ஏற்படும். மூதலில் மூதிர்ந்த இலகைள் மகூசள் நிறமாக மூறும் பின் இளம் இலகைள் மகூசளாகும். இறூதியில் தூவரம் இறந்து விடும். மகூலும் வரேர் பகூதியில் கரூப்பு நிறமூற்றம் தனென்படும். இதனகைக் கட்டுப்படுத்த ஓரூ ஏக்கரூக்கூ 1கிலகூ என்ற அளவில் பிர்கைக்ககூடெர்மா விரிபியினகை தண்ணீரில் கலந்து தூர் பகூதி நன்கூ நனய்யம் படி ஊற்றவாம். மகூலும் ஓரூ லிட்டர் தண்ணீரூக்கூ 2½ கிராம் என்ற அளவில் கூப்பர் ஆக்கிகூளகூரகை மரூந்தினகை கலந்து இலகை வழியாக தனெளிகக வணேடும்.

கூல்நடகை:

தற்பகூதூ மூட்டூக்ககூட்டககைளில் ககூசூக்கள் அதிகமாக கூணப்படும். இவற்றில் பனெண் ககூசூக்கள் மூட்டயிடுவதற்காக மூடகூளகை கடித்து இரத்தத்தகை உறிகூசூகிறதூ. மகூலும் அதிக இரத்த இழப்பால் கூல்நடகைள் உடல் எடகை இழப்பு மற்றும் பால் உற்பத்தி கூறயகை வாய்ப்புள்ளதூ சில நகூரங்கலில் கூல்நடகைள் இறந்து விடவாம் கூடும். ககூசூக்ககைக் கட்டுப்படுத்த மூதலில் நீர்த் தகூக்கங்கள் ஏதும் அரூகில் இரூப்பின் அதனகை நீக்கி சூத்தம் சயெய் வணேடும். வபேபிலகை மற்றும் சாம்பிரூணி ககூண்டூ பூககைமூட்டூதல், ககூசூ மரூந்தகை கூற்றில் நீர்த்திவலகைளாக தனெளிப்பதூ பகூன்ற சயெல்கலின் மூலமாக ககூசூககை அழிககலாம். இரூப்பினும் இதூ ஓரூ தற்கூலிக தீர்வயகூகும்.