| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSSRF Science for Sustainable Development | வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை<br>இணைந்து வழங்குபவர்கள்<br>பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை<br>ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்<br>ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் | | | | | |
| | மாவட்டம் : | தேனி | காலம் : | 13/09/2023 | முதல் | 17/09/2023 |
| | அறிக்கை எண் : | 073/ 2023 | வெளியீட்டு நாள் : | | 12/09/2023 | |

### தேனி மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34°-39° செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மேலும் மழை பெறப்பட்டது.

| கடந்தவார வானிலை (07.09.2023 முதல் 11.09.2023) | | | | | | அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு – 17-09-2023- 08.30 வரை | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | தேதி | நாள்-1 13/09 | நாள்-2 14/09 | நாள்-3 15/09 | நாள்-4 16/09 | நாள்-5 17/09 |
| 3.0 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | மழை (மி.மீ) | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 35 | 34 | 37 | 37 | 39 | அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்) | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்) | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | மேக மூட்டம் (ஆக்டா) | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 78 | 71 | 61 | 56 | 61 | அதிக மற்றும் குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 56 | 50 | 46 | 47 | 48 | | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 |
| 9 | 15 | 10 | 10 | 8 | காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி ) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| மேற்கு | வட மேற்கு | மேற்கு | மேற்கு | தென் மேற்கு | காற்றின் திசை | மேற்கு | மேற்கு | மேற்கு | மேற்கு | மேற்கு |

### குறுஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் செப்டம்பர் 13, 14, 15, 16ம் தேதிகளில் லேசான மழையும் மற்றும் 17 தேதி மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 30°-32 செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 21°-23° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 10 முதல் 12 கி.மீ வேகத்தில், மேற்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

ஆங்காங்கே சிறிதளவு மழை பெறப்பட்டுள்ளதாலும், அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதாலும் விவசாயிகள் உழவு செய்தல் மற்றும் நிலம் தயாரித்தல் வேலைகளுக்கு திட்டமிடலாம். மருந்து தெளிக்கும் வேலைகளை சற்றே ஒத்திவைக்கும் படியும் மழைநீரை சேகரிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படியும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மேய்ச்சலின் போது போதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும். இந் காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு வெளியே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பா கொட்டகைகளில் கட்டி வைக்கும்படியும் கேட்டுகொள்ளப் படுகிறார்கள் இடி மின்னலில் இருந்து தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு கழுத்தில் கட்டியுள்ள உலோ மணிகளை அகற்றிவிடவும்

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மணிக்கு 10 முதல் 12 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரும்பு, வாழை, பப்பாளி, கொய்யா, முருங்கை போன் பயிர்களுக்கு மண் அணைத்தல், முட்டுகொடுத்தல், விட்டம் கட்டுதல் போன்ற பாதுகாப் நடவடிக்கைகளை மேற்க்கொள்ளவும். கொடிவகை பயிர்களில் பந்தல்களில் துருபிடித்த பழுதடைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும் தூண்களை கண்டறிந்து சரி செய்யவும். போதுமான முட்டுகளை கொடுக்கவும். பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிக்கும் வேலைகளை ஒத்திவைக்கவும்.

**எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்**
**முக்கிய பயிர்கள் : தக்காளி, பருத்தி, கால்நடை.**

**தக்காளி:**

மானாவாரியில் நடவு செய்யப்படும் தக்காளி பயிரில் மண் மூலமாக பரவும் நோய்களின் தாக்குதலுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது.

இவ்வாறு பரவக் கூடிய நோய்களை உயிரியல் முறையில் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்க தலா 5 கிலோ என்ற அளவில் ட்ரைகோடெர்மா விரிடி மற்றும் சூடோமோனாஸ் புளோரேசன்ஸ் ஆகியவற்றை போதுமான தொழு உரத்துடன் நன்கு கலந்து இட வேண்டும்.

**பருத்தி:**

பருத்தியில் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுகள் பரவலாக தென்படலாம். துத்தநாக குறைபாடுள்ள நிலங்களுக்கு எக்டருக்கு 50 கிலோ துத்தநாக சல்பேட் இட வேண்டும். பயிர் வளர்ச்சியின் போது குறைபாடு தென்பட்டால் 0.5சத துத்தநாக சல்பேட் கரைசலை விதைத்த 45, 60 மற்றும் 75 நாட்களில் தெளிக்க வேண்டும்.

மெக்னீசியம் குறைபாடு உள்ள நிலங்களுக்கு எக்டருக்கு 20 கிலோ மெக்னீசியம் சல்பேட்ட இட வேண்டும்.

பருத்தி காய் உருவாகும் பருவத்தில், தேவையின் அடிப்படையில் இலைவழித் தெளிப்பாக சத மெக்னீசியம் சல்பேட் மற்றும் 1 சத யூரியாவும் தெளிக்க வேண்டும்

**கால்நடை:**

கால்நடை கன்றுகளுக்கு அயர்ச்சி ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளதால். கால்நடை வளர்ப்போர் தங்களின் கன்றுகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 30 கிராம் தாதுஉப்புக் கலவை கொடுக்க வேண்டும்.

மேலும் கால்நடை மருத்துவரின் ஆலோசனை பெற்று கன்றுகளுக்கு முறையான இடைவெளியில் குடற்புழு நீக்கம் செய்வது மிகவும் அவசியமாகும்.

.