



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்

கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 27-02-2024

தி -நீல்கிரிஸ்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-02-27 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-02-28	2024-02-29	2024-03-01	2024-03-02	2024-03-03
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	12.0	11.0	12.0	12.0	11.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	80	80	60	60
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	20	20	20	20	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6	6	8	4	6
காற்றின் திசை (கோணம்)	90	90	90	110	110
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	2	3	3	2

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இருந்து முக்கியமாக தெளிவாக காணப்படும். அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 21- 22°செஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 11-12°செஆகவும் இருக்கக்கூடும். காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 60-90 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 20-30 சதவிகிதமாகவும் இருக்கக்கூடும்.சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 04-08 கி.மீஅளவுக்கு வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

எந்தவொரு பயிர்த் திட்டத்திற்கும் முன் மண் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். பிப்ரவரி 2024 இல் மலைப்பகுதி காய்கறிகளை விதைக்கத் தயாராக இருக்கும்விவசாயிகள், விதை மற்றும் மண்ணில் பரவும் நோய்க்கிருமிகளைக்கட்டுப்படுத்த, விதைகளை டிரைக்கோடெர்மா விரிடி @ 4 கிராம்/கிலோ அல்லது பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் @ 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில்

விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பாகற்காயில் அசவினி மற்றும் தத்துப்பூச்சி நிர்வகிக்க, இமிடாக்ளோபிரிட் 70 WG 1.0g/10lit இலைகளில் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கருமிளகு	குருமிளகாயில் வாடல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த, விவசாயிகள் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு @ 0.2% (மண்ணை அள்ளாதல்) அல்லது பொட்டாசியம் பாஸ்போனேட் @ 0.3% அல்லது மெட்டாலாக்சில் @ 0.1% பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
முள்ளங்கி	கேரட்டில் நூற்புழு மேலாண்மைக்கு, நடவு செய்யும் போது எக்டருக்கு 1 டன் வேப்பம் பிண்ணாக்கு மண்ணில் இடவும். கடுகு செடிகளை உயிரி புகையாக்குதல் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்கு ஒரு ஹெக்டருக்கு 250 கிலோ இடுதல், பர்ப்யூரோசிலியம் லிலாசினம் @ 5 கிலோ/எக்டருக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
பூண்டு	பூண்டு குமிழ் விளைச்சலை அதிகரிக்க நடவு செய்த 30, 45 மற்றும் 60 நாட்களில் நீரில் கரையக்கூடிய நுண்ணூட்டச் சத்து கலவையை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 0.50 கிராம் என்ற அளவில் இலையில் இடலாம். பூண்டு பயிரில் இலைப்புள்ளி / ஊதா நிற கருங்கல் ஏற்படுவதை நிர்வகிக்க, மான்கோசெப் @ 2 கிராம்/லி அல்லது காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு @ 2.5 கிராம்/லி இலைவழி தெளிக்கவும்.