

## மரவள்ளி

### 1.மரவள்ளி செதில் டீச்சி : *அயோனிடோமைடிலஸ் ஆல்பீ.*

#### சேதத்தின் அறிகுறிகள் :

- செடியின் தண்டு பகுதிகளை தாக்கும்.
- தாக்கப்பட்ட இலைகள் நிறம்மாறியும், உலர்ந்தும் விடும்.
- செடியின் வளர்ச்சி குன்றிவிடும்.

#### டீச்சியின் விபரம்:

- உறுதியான செதில்கள், நீள்வட்டவடிவில் தசைகள் போன்று இருக்கும்.

#### கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் :

- டீச்சிகளற்ற (செதில்டீச்சிகள்) கரணைகளை நடவுக்கு தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
- தாக்கப்பட்ட தண்டினை அழிக்கவும்.
- மீதைல் டெமிட்டான் 0.25 சதம் தெளிக்கவும்.

### 2.மரவள்ளி மாவுப் டீச்சி : *பீணாகாஃக்கஸ் மேனிஹர்ட்டி.*

#### சேதத்தின் அறிகுறிகள் :

- மரவள்ளியின் இளம்தளிர், தண்டு மற்ற இலையின் அடிப்பரப்பில் இருந்து சாற்றை உறிஞ்சி சேதப்படுத்தும். சாற்றை உறிஞ்சும்பொழுது மரவள்ளியில் நச்சுப்பொருளை உட்செலுத்தும்.
- நுணிக்குருத்துகள் உருமாறியும், வளர்ச்சிக்குன்றியும் காணப்படும்.

- செடியின் நுணியிலுள்ள இலைகள் ஒன்றாக இணைந்து “முடிக்கொத்தாக” தோற்றமளிக்கும்.
- இடைகணுக்குள் நீளம் குறைந்துவிடும். தண்டுகள் சிதைவடைந்து காணப்படும்.

**வீச்சியின் விபரம் :**

- மாவுவீச்சி இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
- உடல்முழுவதும் சிறு வலிமைகள் காணப்படும். மேலும் மெழுகு போன்ற வெண்வீச்சு மூடியிருக்கும்.

**கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:**

- மாலத்தியான் அல்லது ஃபெனிட்ரோதியான் @ 1மி.லி / லிட்டர் தெளிக்கவும்.

**3.சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ : அலிரோடைகஸ் டிஸ்பர்சஸ்.**

**சேதத்தின் அறிகுறிகள் :**

- இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிடும்.
- செடிகளில் கீழ்பாகத்தில் உள்ள இலைகளில் கரும்புகைவீச்சணம் தோற்றுவிக்கும்.
- தாக்கப்பட்ட இலைகள் உதிர்ந்து விடும்.

**வீச்சியின் விபரம்:**

முட்டை: வட்டவட்டமாக இலைகளின் அடிப்பரப்பில் இட்டு வெண்ணிற  
மாவுப்ச்சால் மூடியிருக்கும்.

இளங்குஞ்சுகள்: உடலில் மெழுகால் ஆன கண்ணாடி போன்ற உருளைகள்  
சமச்சீரான இடைவெளியில் காணப்படும்.

ஃச்சி: மாவு போன்ற வெண்ணிறமானது. அதிகாலையில் ஃச்சிகளின் நடமாட்டம்  
அதிகமாக இருக்கும்.

### 3. வெள்ளை ஈ: பெய்சியாடபாசி :

சேதத்தின் அறிகுறிகள்:

- முதலில் வெண்புள்ளிகள் தோன்றி பிறகு அவை ஒன்றாக இணைந்து மஞ்சள்  
நிறமாக மாறிவிடும்.
- கடுமையாக தாக்கப்பட்ட செடிகள் முதிரா நிலையில் இலைகள்  
அனைத்தையும் உதிர்த்துவிடும்.
- கரும்புகை ஃசணத்தை ஏற்படுத்தும்
- மரவள்ளிதேமல் நோயை பரப்பும்.

ஃச்சியின் விபரம் :

முட்டை: இளந்தளிர் இலைகளின் அடிப்பகுதியில் காம்புடைய, பெரிப் பழம்  
வடிவில், வெளிர்மஞ்சள் நிற முட்டை காணப்படும்.

இளங்குஞ்சுகள்: முட்டை பொரித்தவுடன் வெளிவரும் இளம் குஞ்சுகள் நீள வட்ட  
வடிவில், மாவுப் ஃச்சி போன்று பச்சை கலந்த வெள்ளை நிறத்துடன்  
இருக்கும்.

**வீச்சிகள்:** சிறு வெண்ணிற வீச்சிகள், இலைகளில் அடைஅடையாக மாவும்வீச்சிகளை

போன்று காணப்படும்.

**கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் :**

பின்வரும் வீச்சிக்கொல்லிகள் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கவும்:

- ஃபாசலோன் @ 2.5 லிட்டர் / ஹெக்டேர்
- குவினால்பாஸ் @ 2.0 லிட்டர் / ஹெக்டேர்
- மானகுரோட்டோஃபாஸ் @ 1.25 லிட்டர் / ஹெக்டேர்
- ட்ரைஅசோஃபாஸ் @ 2 லிட்டர் / ஹெக்டேர்.